

۱- تومورهای بدخیم بافت غده‌ای چه نامیده می‌شود؟

۱- کندروسارکوما ۲- لیپوسارکوما ۳- آدنوکارسینوما ۴- گلیوما

۲- علت بیشترین صدمات وارده بر سیستم گوارش پس از شیمی درمانی کدام مورد است؟

۱- رشد سریع سلول‌های اپی تلیال ۲- مصرف غالب داروها از راه خوراکی ۳- بی‌اشتهایی ناشی از پیشرفت بیماری ۴- اختلال آب و الکترولیت‌ها

۳- بیماری با سابقه‌ی مصرف جنتامایسین، پس از چند روز کاهش حجم ادرار، بی‌قراری و خواب‌آلودگی در طی ساعت اخیر، لیتر ادرار رقیق دفع کرده است. احتمال بروز کدام عارضه است؟

۱- نارسایی حاد کلیه ۲- سندرم نفروتیک ۳- گلودولونفریت ۴- تومور مثانه

۴- در ساعت اولیه پس از جراحی نخاعی، کدام شوک بیشتر از بقیه بیمار را تهدید می‌نماید؟

۱- هموراژیک ناشی از عروق صدمه دیده ۲- هیپوولمیک ناشی از تشکیل استخر خونی

۳- آنافیلاکتیک ناشی از ایجاد حساسیت به داروهای بیهوشی ۴- کاردیوژنیک ناشی از تحریک گره دهلیزی بطنی

۵- کدام یک از انواع نخ‌بخیه، بیشتر از سایرین در بیماران ایجاد حساسیت می‌نماید؟

۱- ابریشم ۲- نایلون ۳- کاتکوت کرومیک ۴- کاتکوت ساده

۶- اگر بیمار تراکتوستومی می‌شده، پس از مصرف هر نوبت غذا، احساس خفگی و سرفه نماید، احتمالاً دچار کدام عارضه است؟

۱- استنوز تراشه ۲- اتساع تراشه ۳- نکرور جدار تراکتوبرونشیال ۴- فیستول مری و تراشه

۷- بیماری که هنوز در مرحله انکار بوده و قادر به فراگیری شستشوی محل استومی خود نمی‌باشد، عدم آمادگی او کدام است؟

۱- روحی ۲- جسمی ۳- تجربی ۴- محیطی

۸- کدام یک از کلتستومی‌ها را نباید شستشو داد؟

۱- حلقه ۲- دوپل ۳- دایم ۴- مرطوب

۹- اتواسکلروزیس عامل چه نوع کری است؟

۱- عصبی ۲- انتقالی ۳- درکی ۴- مختلط

۱۰- بیماری که سابقه فشار خون بالا دارد علاوه بر کاتاراکت ممکن است بیماری به کدام قسمت چشم صدمه بزند؟

۱- ایریس ۲- رتین ۳- اسکلرا ۴- قرنیه

۱۱- چنانچه بیمار دچار افزایش داخل جمجمه (IICP) باشد، کدام مورد زیر برای وی خطرناک است و علت آن کدام است؟

۱- کاهش حجم مایعات بدن به دلیل اختلال مایعات و الکترولیت‌ها ۲- مصرف مایعات هیپروتونیک وریدی به دلیل افزایش مایعات بدن

۳- تمیز نبودن راه عبور هوا و ساکشن غیر صحیح به دلیل کاهش اکسیژن مغز ۴- وضعیت نیمه نشسته به دلیل کاهش اکسیژن مغز

۱۲- مصرف هیدروکسید آلومینیوم در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه به چه منظور است؟

۱- جذب کلسیم اضافی سرم ۲- افزایش فسفر پلاسما ۳- جذب فسفر اضافی پلاسما ۴- کاهش پتاسیم سرم

۱۳- در بیماران مبتلا به صدمات نخاعی که عمل تزریق در آنها انجام نمی‌گیرد، پرستار مراقب بروز کدام عارضه است؟

۱- هیپرتانسیون ۲- هیپوترمی ۳- تاکی پنه ۴- تاکی کاردی

۱۴- وجود موج U به دنبال موج T حاکی از اختلال در کدام مورد زیر است؟

۱- اشکال در محور قلب ۲- الکترولیت‌ها ۳- تغذیه ۴- مسمومیت دارویی

۱۵- سن مناسب برای تزریق در توده عضله سریت (ربع فوقانی و خارجی) کودکان کدام است؟

۱- ۲ سالگی ۲- ۱/۵ سالگی ۳- ۶ ماه پس از راه افتادن ۴- ۱ سال پس از راه افتادن

۱۶- مدت زمان طبیعی آپنه‌ها در دوران نوزادی کدام است؟

۱- کمتر از ۱۵ ثانیه ۲- تا ۳۰ ثانیه ۳- تا ۴۵ ثانیه ۴- حداکثر ۱ دقیقه

۱۷- سه علامت اصلی تشخیص انسداد روده در کودک کدام است؟

۱- عدم دفع مدفوع، تب، بی‌حالی ۲- نفخ شکم، استفراغ، عدم دفع مدفوع ۳- تهوع، عدم دفع مدفوع، ضعف ۴- افزایش نبض، رنگ پریدگی، نفخ شکم

- ۱۸- برای ایجاد آرامش در شیرخوار مبتلا به برونشیت، کدام وضعیت مناسب است؟
 - ۱- پا بالاتر از سر
 - ۲- خوابیده به پش
 - ۳- خوابیده به پهلو
 - ۴- سر بالاتر از بدن
- ۱۹- شایع ترین نشانه بیماری در شیر خواران و کودکان کدام است؟
 - ۱- اسهال
 - ۲- استفراغ
 - ۳- تب
 - ۴- بی قراری
- ۲۰- عقب ماندگی ذهنی در کدام مورد قابل پیشگیری است؟
 - ۱- گالاکتوزومی
 - ۲- هیپوتیروئیدیسم
 - ۳- سندرم داون
 - ۴- فلج مغزی
- ۲۱- عارضه بیماری آبله مرغان (واریسلا) کدام است؟
 - ۱- میوکاردیت
 - ۲- گاستروآنتریت
 - ۳- زرد زخم
 - ۴- اوتیت میانی
- ۲۲- از اصول مهم پانسمان سوختگی کدام است؟
 - ۱- قرار ندادن دو سطح پوست رو هم
 - ۲- ایجاد محدودیت حرکتی در کودک
 - ۳- استفاده از باندهای ساده
 - ۴- استفاده از روش ساده دور به نزدیک
- ۲۳- نشانه های اصلی در تشخیص تب روماتیسمی حاد کدام است؟
 - ۱- تب و کاردیت
 - ۲- خستگی و خونریزی از بینی
 - ۳- پلی آرتريت، لاغری
 - ۴- پلی آرتريت، کاردیت
- ۲۴- سن آسیب پذیری فرد جهت ابتلا به اختلالات روانی کدام است؟
 - ۱- نوزادی
 - ۲- کودکی
 - ۳- نوجوانی
 - ۴- جوانی
- ۲۵- سریع ترین واکنش روانی نسبت به تنیدگی کدام است؟
 - ۱- اضطراب
 - ۲- افسردگی
 - ۳- بی خوابی
 - ۴- پر خوری
- ۲۶- در پرستاری از فرد بحران زده، اولویت با کدام اقدام است؟
 - ۱- بستری نمودن
 - ۲- درمان دارویی
 - ۳- فعال نمودن
 - ۴- امنیت و حفاظت
- ۲۷- هذیان (Delusion) کدام است؟
 - ۱- پرش افکار
 - ۲- اعتقاد غلط و ناپایدار
 - ۳- باورهای درست و پایدار
 - ۴- اعتقاد غلط و پایدار
- ۲۸- شایع ترین توهم در اسکیزوفرنیا کدام است؟
 - ۱- بینایی
 - ۲- شنوایی
 - ۳- بویایی
 - ۴- چشایی
- ۲۹- شایع ترین عارضه در درمان با شوک الکتریکی (ECT) کدام مورد است؟
 - ۱- مرگ ناگهانی
 - ۲- فلج عمومی
 - ۳- فراموشی
 - ۴- بیهوشی
- ۳۰- آمفتامین جزو کدام دسته از داروها است؟
 - ۱- محرک ها
 - ۲- مخدرها
 - ۳- توهم زاها
 - ۴- آرام بخش ها
- ۳۱- اختلال سایکوسوماتیک (عوامل روان شناختی موثر بر جسم) کدام است؟
 - ۱- روانی با منشا هیجانی
 - ۲- روانی با منشا جسمی
 - ۳- جسمی بدون منشا روانی
 - ۴- جسمی با منشا روانی
- ۳۲- در اسکیزوفرنیای نوع کاتانونیک، اختلال در چه قسمتی است؟
 - ۱- تفکر
 - ۲- روانی-حرکت
 - ۳- درک
 - ۴- رفتار
- ۳۳- کدامیک یک از مراحل زیر موجب افزایش دانش بهداشتی و دگرگونی رفتارهای بهداشتی می شود؟
 - ۱- آنالیز
 - ۲- تبلیغات
 - ۳- حساس سازی
 - ۴- انگیزش
- ۳۴- ایمنی غیر فعال اکستابی در نتیجه ی کدام مورد ایجاد می شود؟
 - ۱- ابتلا به بیماری ها
 - ۲- تزریق سرم
 - ۳- تزریق واکسن ها
 - ۴- از طریق جفت
- ۳۵- محل تزریق واکسن ب.پ.ژ کدام است؟
 - ۱- زیر جلد-بازو
 - ۲- درون پوست-ساعد
 - ۳- داخل عضله-بازو
 - ۴- داخل جلدی-بازو
- ۳۶- خصوصیات دموگرافیک یعنی:

- ۱- متغیرهای بهداشتی محیط ۲- متغیرهای مربوط به جمعیت ۳- میزان مهاجرت در جامعه ۴- نسبت منابع موجود به جمعیت
- ۳۷- در سطح روستا عرضه ی خدمات بهداشتی اولیه توسط کدام است؟
- ۱- خانه های بهداشت ۲- رابطین بهداشت ۳- تیم سیار ۴- پیام آوران بهداشت
- ۳۸- موارد منع استفاده از IUD کدام است؟
- ۱- سابقه ی عفونت ادراری ۲- ناهنجاری های واژن ۳- بیماری های کبدی ۴- بیماری های دریچه ای قلب
- ۳۹- به چه منظوری از مانور لئوپولد (LEOPOLD) استفاده می شود؟
- ۱- تعیین وضعیت جنین ۲- ارزیابی سلامت ۳- چگونگی پیشرفت زایمان ۴- ارزیابی وضعیت سرویکس
- ۴۰- اصطلاح سومنابولیس (Somnambulism) به چه معنا است؟
- ۱- پر خوابی ۲- محرومیت ۳- راه رفتن در خواب ۴- به هم فشردن دندان ها در خواب
- ۴۱- اختلال شوک آندوتوکسین کدام است؟
- ۱- اسیدوز تنفسی ۲- آلكالوز تنفسی ۳- آلكالوز متابولیک ۴- اسیدوز متابولیک
- ۴۲- ضرورت رعایت ایزولاسیون تنفسی در کدام بیماری مطرح است؟
- ۱- جذام ۲- کزاز ۳- مننژیت مننگوکوکسی ۴- بوتولیسم
- ۴۳- دارویی که نمی توان از طریق TPN تزریق کرد و باید از طریق ورید محیطی تزریق شود، کدام است؟
- ۱- کلسیم ۲- انسولین ۳- دیگوکسین ۴- بی کربنات سدیم
- ۴۴- اولویت مراقبت پرستاری در بیمار میاستنی گراویس کدام است؟
- ۱- رفع اسپاسم های عضلانی دردناک ۲- پیشگیری لز آسپیراسیون ریوی
- ۳- باز نگه داشتن راه هئایی فوقانی ۴- اهمیت مصرف دارو
- ۴۵- وضعیت صحیح بیمار بعد از عمل جراحی مغزی زیر چادرینه، کدام مورد زیر باید باشد؟
- ۱- نیمه نشسته ۲- خوابیده به پشت ۳- نشسته کامل ۴- خوابیده به پهلو
- ۴۶- تشویق به استفاده از حمام سرد یا ولرم، در کدام مورد توصیه می شود؟
- ۱- مولتیپل اسکلروزیس ۲- صرع گراندمال ۳- مننژیوما ۴- پارکینسون
- ۴۷- آموزش به بیمار پس از تمپانوپلاستی، کدام مورد است؟
- ۱- درمان فوری ماستوئیدیت ۲- برداشتن لوزه ها ۳- اجتناب از تخلیه ی بینی با فشار ۴- اجتناب از استحمام
- ۴۸- بعد از توراستنژ، نکته مهم مراقبتی کدام است؟
- ۱- پوزیشن نشسته ۲- انجام فیزیوتراپی ریه ۳- پانسمان فشاری در محل ۴- درناژ وضعیتی
- ۴۹- مهم ترین عارضه ساکشن تراشه بیش از ۱۰ ثانیه بدون هیپرونتیلیاسیون کدام است؟
- ۱- کنده شدن نسج و خونریزی ۲- دیس ریتمی و ایست قلبی ۳- برونکواسپاسم ۴- عفونت مجاری هوایی
- ۵۰- بهترین اقدام پرستار در کرامپ های داغ عضلانی کدام است؟
- ۱- دادن مایعات کافی به بیمار ۲- خنک کردن بیمار ۳- خوراندن نمک به بیمار ۴- استراحت
- ۵۱- اندازه گیری دید محیطی در کدام یک از اختلالات چشمی اهمیت دارد؟
- ۱- کاتاراکت ۲- گلوکوم ۳- یرینیس ۴- دکلمان رتین
- ۵۲- در کدام یک از دیس ریتمی های ذیل از شوک سینکروتایز استفاده می شود؟
- ۱- آسیستولی ۲- فلوتر بطنی ۳- فیبریلاسیون بطنی ۴- تاکی کاردی بطنی
- ۵۳- شایع ترین علت ایجاد عفونت مجاری ادراری در هر دو جنس کدام است؟
- ۱- دیابت ملیتوس ۲- توقف ادرار در مثانه ۳- الودگی مجرای ادراری ۴- معاینات سیستوسکوپی
- ۵۴- هدف اولیه و فوری در پرستاری از بیماران مبتلا به سنگ کلیه کدام است/

- ۱- برقراری تعادل مایعات ۲- تخفیف درد ۳- برقراری رژیم غذایی ۴- شکستن سنگ
- ۵۵- در کدام یک از موارد ذیل می‌توان بیماری سل را به طور قطعی تشخیص داد؟
- ۱- تست توپرکولین مثبت ۲- آزمون خلط مثبت ۳ ۴- علائم حاد تنفسی ۴- نقاط کلسیفیه در رادیوگرافی
- ۵۶- هنگام مصاحبه با کودک و خانواده، وظیفه‌ی پرستار کدام است؟
- ۱- گوش دادن به والدین ۲- پاسخ دادن به سوالات آنها ۳- صحبت نمودن متقابل پرستار ۴- عدم استفاده از پاسخ‌های کلامی
- ۵۷- هنگام حذف ناگهانی تکیه‌گاه، نوزاد اندام‌ها را ابتدا باز و سپس جمع می‌کند، این حالت کدام رفلکس می‌باشد؟
- ۱- بابینسکی ۲- مورو ۳- تونیک‌نک ۴- روتینگ
- ۵۸- پس از واکسیناسیون DPT کدام حالت طبیعی می‌باشد؟
- ۱- بی‌حالی ۲- تب خفیف ۳- اسهال ۴- احتقان بینی
- ۵۹- علامت کرانیوتابیس در بررسی جمجمه مربوط به کمبود کدام ویتامین در کودک است؟
- ۱- B ۲- C ۳- D ۴- E
- ۶۰- در صورت مصرف ناکافی کالری در شیر خوار ۸ ماهه کدام شاخص رشدی در مرحله‌ی اول کاهش می‌یابد؟
- ۱- قد ۲- وزن ۳- دور سر ۴- دورسینه
- ۶۱- منفی‌گرایی در کودکان نوپا نشانه کدام مورد است؟
- ۱- تربیت نادرست ۲- ایجاد حس استقلال ۳- تحریک زیاد ۴- اضطراب جدایی
- ۶۲- شایع‌ترین محل خونریزی داخلی کودکان مبتلا به هموفیلی کدام است؟
- ۱- مغز ۲- روده‌ها ۳- مفاصل ۴- انتهای استخوانهای دراز
- ۶۳- در کودک دیابتی چه هنگام نیاز به اضافه کردن انسولین نمی‌باشد؟
- ۱- عفونت ۲- ورزش ۳- جراحی ۴- استرس
- ۶۴- مدت سپری شدن بحران معمولاً است.
- ۱- ۴-۶ هفته ۲- ۵-۶ هفته ۳- ۱۸-۱۴ روز ۴- ۴-۲ هفته
- ۶۵- Psychosis اختلال در کدام مورد است؟
- ۱- عملکردی ۲- شخصیتی ۳- در آزمون واقعیت ۴- روابط بین فردی
- ۶۶- تجویز مایعات کافی به فرد سالمند، در پیشگیری و درمان اختلالات کدام دستگاه، کمک بیشتری می‌کند؟
- ۱- حسی حرکتی ۲- قلب و عروق ۳- تنفس ۴- تولید مثل
- ۶۷- مهم‌ترین علت اختلالات کنشی جنسی کدام است؟
- ۱- اضطراب ۲- داروها ۳- ارگانیک ۴- ترس
- ۶۸- کدام یک از تشخیص‌های پرستاری زیر در بحران اولویت دارد؟
- ۱- تغییر در فرآیند تفکر ۲- اختلال در الگوی خواب ۳- توانایی بالقوه جهت آسیب به خود ۴- اختلال در روابط اجتماعی
- ۶۹- مهم‌ترین هدف از مداخلات پرستاری در تنیدگی کدام است؟
- ۱- آموزش بیمار ۲- مصاحبه و مشاهده ۳- تغییر رفتار غیر انطباقی به رفتار انطباقی ۴- از بین بردن عامل تنیدگی
- ۷۰- کدامیک از گزینه‌های زیر به معنایی اختلال در محتوای فکر است؟
- ۱- Echolalia ۲- Illusion ۳- Delusion ۴- Obsession
- ۷۱- مناسب‌ترین معرف از وضعیت بهداشتی جامعه کدام شاخص است؟
- ۱- ابتلا و میرایی ۲- مرگ و میر کودکان زیر یک سال ۳- مرگ و میر زنان باردار ۴- مرگ و میر کلی جامعه
- ۷۲- کاربرد کدام واکسن برای زنان باردار مجاز است؟

- ۱- ویروسی زنده ۲- میکروبی ضعیف شده ۳- توکسوئید میکروبها ۴- ویروس ضعیف شده
- ۷۳- استفاده از عینک و سمعک جزء کدام سطح پیشگیری است؟
- ۱- اول ۲- دوم ۳- سوم ۴- مقدماتی
- ۷۴- عدم مطالعه توزیع عوامل تعیین کننده‌ی بیماری‌ها آسیب‌ها در جامعه انسانی چه نام دارد؟
- ۱- اکولوژی ۲- مورفولوژی ۳- آنترپولوژی ۴- اپیدمیولوژی
- ۷۵- شاخص‌های مورد نظر در ارزشیابی بازدید منزل کدامند؟
- ۱- دستیابی خانواده به استقلال مالی ۲- توجه خانواده به وضعیت بهداشتی خود ۳- توجه خانواده به مشکلات رفتاری خود ۴- تغییر رفتار و کاهش میزان بیمار
- ۷۶- کلر مادر اصطلاحاً کلری است که:
- ۱- به شبکه آب محلی افزوده شود ۲- در خانه توسط مادران تهیه شود
- ۳- به منبع اصلی آب یا به آب چاه افزوده شود ۴- توسط مرکز بهداشتی یا خانه‌ی بهداشت تهیه شود
- ۷۷- چه درصدی از کودکان در محدوده‌ی تغییرات طبیعی منحنی رشد قرار می‌گیرند؟
- ۱- ۹۷٪ ۲- ۷۵٪ ۳- ۵۰٪ ۴- ۳۰٪
- ۷۸- با تزریق گلبولین در بدن، کدام ایمنی به وجود می‌آید؟
- ۱- اکتسابی فعال ۲- اکتسابی غیر فعال ۳- طبیعی فعال ۴- طبیعی غیر فعال
- ۷۹- با خونریزی قاعدگی، کدام قسمت رحم ریزش می‌کند؟
- ۱- لایه وظیفه‌ای اندومترיום ۲- مایومترיום ۳- لایه پایه اندومترיום ۴- لایه پارامتریوم
- ۸۰- استفاده از قرص‌های پیشگیری از بارداری، موجب توقف کدام مورد می‌شود؟
- ۱- تقسیمات تخم ۲- تخمک گذاری ۳- لقاح ۴- لانه گزینی تخم
- ۸۱- تغییرات گوارشی در دوران حاملگی کدام است؟
- ۱- افزایش تحریک معده و روده‌ها ۲- انقباض عمومی عضلات صاف ۳- افزایش فشار داخل مری ۴- تاخیر در تخلیه معده
- ۸۲- با مشاهده‌ی کدام علامت در نوزاد، مادر باید به پزشک مراجعه کند؟
- ۱- تغییر رنگ پوست به آبی ۲- استفراغ پنیری شکل ۳- ترشحات خونی از واژن ۴- ترشح شیر از پستان
- ۸۳- کدام یک از موارد زیر جزء تغییرات بعد از زایمان می‌باشد؟
- ۱- عدم دفع ادرار ۲- تعریق زیاد ۳- بی‌اشتهایی ۴- افزایش فشار خون
- ۸۴- فایده‌ی ورزش کگل (kegel) کدام است؟
- ۱- بهبود وضعیت تنفس ۲- کمک به تونیسیتیه‌ی عضلات شکم ۳- تقویت عضلات پرینه ۴- بهبود گردش خون در پاها
- ۸۵- مراقبت پرستاری بلافاصله پس از زایمان کدام است؟
- ۱- کنترل رحم هر یک ربع ساعت ۲- بررسی پاها هر ۲ ساعت ۳- کنترل لوشیا هر یک ساعت ۴- بررسی پرینه هر ۶ ساعت
- ۸۶- اقدام پرستاری قبل از تعویض خون برای نوزاد، کدام است؟
- ۱- دادن آب قند ۲- قرار دادن به پهلوی چپ ۳- حمام کردن ۴- گرم نگه داشتن
- ۸۷- عارضه‌ی بی حسی اپیدورال با نارکوتیک کدام است؟
- ۱- افت فشار خون و نبض ۲- خارش پوست صورت ۳- سردرد و سرگیجه ۴- تکرار ادرار
- ۸۸- مصرف کدام یک از داروهای زیر به طور همزمان از یک رگ، خطرناک است؟
- ۱- بی‌کربنات سدیم و کلسیم ۲- بی‌کربنات سدیم و لیدوکائین ۳- آدرنالین و آتروپین ۴- تونسیلات برتیلیوم و آدرنالین
- ۸۹- مهم‌ترین هدف از توان‌بخشی بیماران کدام است؟
- ۱- آموزش به جامعه برای جلوگیری از ایجاد معلولیت ۲- بالا بردن سطح اقتصاد و وضعیت معیشت جامعه
- ۳- تسکین آلام جسمی و روانی بیماران ۴- تامین استقلال فردی در انجام فعالیت‌های روزمره

۹۰- پس از انجام آندوسکوپی چه توصیه‌ای بایستی به بیمار نمود؟

۱- فقط مایعات سرد بنوشد ۲- NPO بماند ۳- تا برگشت رفلکس بلع خوردن و آشامیدن پرهیز نماید ۴- بلافاصله پس از اتمام پروسیجر می‌تواند تغذیه را شروع کنی

۹۱- برای جلوگیری از کدام عارضه پس از بیوپسی کبد، بیمار را به پهلو راست قرار می‌دهند؟

۱- پریتونیت ۲- ادم ریوی ۳- خونریزی ۴- نشت مواد صفراوی

۹۲- در موقع آموزش به خانم‌ها جهت معاینه‌ی پستان، توصیه می‌نمایید چه زمانی این کار را انجام دهند؟

۱- شروع سیکل ماهانه ۲- یک هفته پس از شروع سیکل ماهانه ۳- هر ماه در زمان تخمک‌گذاری ۴- هفته‌ای یک بار به طور مرتب

۹۳- به علت در سوختگی بیش از ۳۰ درصد سطح بدن، کلیه دچار نارسایی خواهد شد؟

۱- افزایش میزان پتاسیم ۲- هیپراورمی ۳- عفونت پسودومونایی ۴- کاهش جریان خون

۹۴- مصرف تiazیدها (دیورتیک) ممکن است چه عارضه‌ای را برای بیمار دیابتیک ایجاد نماید؟

۱- هیپرگلیسمی ۲- هیپوگلیسمی ۳- هیپرکالمی ۴- هیپوناترمی

۹۵- اولین مورد استفاده از آمبویگ توسط پرستار کدام است؟

۱- ایست تنفسی ۲- فیبریلاسیون بطنی ۳- کنترل برون ده تنفسی ۴- زخم‌های جراحی بزرگ با ترشحات فراوان

۹۶- پس از جراحی تیروئیدکتومی ساب توتال، پرستار مرتباً از بیمار اسمش را می‌پرسد. هدف او از انجام این کار، بررسی کدام مورد است؟

۱- صدمه به عصب لارنژیال ۲- خونریزی داخلی ۳- کاهش سطح هوشیاری ۴- انسداد راه هوایی فوقانی

۹۷- در ایست قلبی بهترین نبض برای ارزیابی بیمار کدام مورد است؟

۱- رادیال ۲- فمورال ۳- ژیگولار ۴- کاروتید

۹۸- مناسب‌ترین پوزیشن برای بیمار پریکاردیتی جهت کاهش درد و برقراری راحتی کدام است؟

۱- خوابیده به پشت ۲- نشسته کمی خم به جلو ۳- خوابیده به پهلو ۴- حالت نیمه نشسته

۹۹- در طرح مراقبتی بیمار با فشار داخل جمجمه (ICP) بالا، از کدام مورد اجتناب می‌شود؟

۱- کاهش تحریکات محیطی ۲- لمس و صحبت با بیمار ۳- چرخش ناگهانی مفاصل ۴- بیدار نکردن بیمار به طور ناگهانی

۱۰۰- پیشنهاد شما در مورد مراقبت از بندناف نوزاد کدام است؟

۱- پانسمان استریل مرطوب با نرمال سالین ۲- استفاده از لوسیون در اطراف بندناف ۳- قراردادن گاز وازلین استریل روی بند ناف ۴- قرار دادن کهنه نوزاد زیر بند ناف

۱۰۱- محل مناسب تزریق عضلانی در کودک ۱/۵ ساله کدام است؟

۱- بخش عمقی عضله دلتوئید ۲- عضله پهلویی ران ۳- ربع فوقانی و خارجی باسن ۴- عضله چهارسر ران

۱۰۲- شرایط مستعد کننده جهت ابتلای کودک به سندرم ری (Rey syndrome) کدام است؟

۱- استفاده از استامینوفن در آنفلونزا ۲- مصرف آسپرین در سیاه سرفه ۳- تجویز استامینوفن در مننژیت ۴- مصرف آسپرین در آبله مرغان

۱۰۳- در کودک مبتلا به تب روماتیسمی، هدف از استراحت مطلق کدام است؟

۱- پیشگیری از تغییر شکل مفاصل ۲- به حداقل رساندن مصرف آب ۳- به حداقل رساندن اثرات فرآیند التهابی ۴- تسکین درد مفاصل

۱۰۴- مهم‌ترین مراقبت پرستاری قبل از عمل جراحی تومور ویلمز کدام است؟

۱- کنترل فشار خون ۲- کمک در انجام آزمایشات ۳- استراحت مطلق ۴- عدم معاینه و لمس شکم

۱۰۵- رژیم غذایی کودک مبتلا به مگاکولون مادرزادی کدام است؟

۱- پرکالری و دارای فیبر زیاد ۲- دارای باقی مانده کم ۳- پرپروتئین و پرچربی ۴- حاوی ویتامین و فیبر زیاد

۱۰۶- در پیشگیری از عفونت ادراری کودکان، اقدام موثر کدام است؟

۱- تخلیه زود به زود مثانه ۲- خودداری از تماس با افراد آلوده ۳- حمام وان به طور مکرر ۴- مصرف زیاد الکترولیت‌ها

۱۰۷- نوزاد مبتلا به فتق دیافراگماتیک قبل از عمل جراحی، در چه وضعیتی قرار داده می‌شود؟

۱- به سمت ریه مبتلا یا نیمه نشسته ۲- در وضعیت Knee chest ۳- به شکم و سر پایین‌تر از تنه ۴- به سمت ریه سالم یا نیمه نشسته

۱۰۸- تاکید اصلی بهداشت روانی کدام مورد است؟

- ۱- کم کردن طول مدت بیماری ۲- کاهش شدت علائم بیماری ۳- محو علائم بیماری ۴- احترام به شخصیت و حیثیت انسانی
- ۱۰۹- عکس‌العمل پرستار در مقابل سکوت بیمار ضمن مصاحبه کدام است؟
- ۱- تغییر دادن موضوع ۲- سکوت کردن ۳- پرسیدن علت سکوت ۴- پایان دادن به جریان مصاحبه
- ۱۱۰- احتمال خودکشی در بیمار افسرده چه هنگامی بالا می‌باشد؟
- ۱- ارتباطی با زمان ندارد ۲- با بیدار شدن در اول روز ۳- بعد از ظهر و غروب ۴- آخر شب هنگام خواب
- ۱۱۱- بیمار بستری در بخش روانی قادر به شناسایی افراد و آشنایان قبلی خود نمی‌باشد مشکل وی اختلال در کدام مورد است؟
- ۱- جهت‌یابی ۲- عاطفه ۳- درک ۴- تفکر
- ۱۱۲- موثرترین درمان در معالجه‌ی فوبیا کدام است؟
- ۱- خانواده درمانی ۲- روان درمانی ۳- رفتار درمانی ۴- گروه درمانی
- ۱۱۳- مهم‌ترین نکته در برقراری ارتباط با بیمار روانی کدام است؟
- ۱- انجام مشاوره ۲- جلب اعتماد ۳- برآوردن نیازهای بیمار ۴- ایجاد یک رابطه‌ی صمیمی
- ۱۱۴- در پرستاری از فردی که دچار بحران شده، کدام اقدام زیر در اولویت قرار دارد؟
- ۱- بستری نمودن مددجو ۲- استفاده از داروهای آرام‌بخش ۳- امنیت و حفاظت مددجو ۴- شرکت در فعالیت‌های گروهی
- ۱۱۵- هدف اصلی آموزش بهداشت کدام است؟
- ۱- تغییر در نگرش فرد ۲- کاهش هزینه‌ها ۳- دادن آگاهی‌های بهداشتی ۴- تغییر رفتار در مددجو
- ۱۱۶- ایمنی اکتسابی ایجاد شده توسط واکسیناسیون کدام مورد است؟
- ۱- فعال طبیعی ۲- فعال مصنوعی ۳- غیر فعال طبیعی ۴- غیر فعال مصنوعی
- ۱۱۷- در منحنی رشد کودکان، پایین‌ترین منحنی معرف کدام مورد زیر است؟
- ۱- صدک پنجاهم وزن نسبت به قد ۲- صدک نود و هشتم وزن نسبت به سن ۳- صدک سوم وزن نسبت به سن ۴- صدک نود و هفتم وزن نسبت به قد
- ۱۱۸- استعداد کودکان در کدام خانواده بهتر رشد می‌کند؟
- ۱- آزادی مطلق ۲- هسته‌ای ۳- دیکتاتوری ۴- دموکراسی
- ۱۱۹- کاتیون‌های عامل سختی آب کدام است؟
- ۱- سدیم، پتاسیم ۲- فلوئور، آهن ۳- کلسیم، منیزیم ۴- کلسیم، سدیم
- ۱۲۰- کدام دسیدوا (Decidua) در تشکیل جفت دخالت دارد؟
- ۱- کپسولی ۲- قاعده‌ای ۳- جداری ۴- پوشاننده
- ۱۲۱- بروز کدام مشکل در دوران بارداری غیر طبیعی است؟
- ۱- تهوع و استفراغ ۲- تکررادرار ۳- کمر درد ۴- تاری دید
- ۱۲۲- اولین علامت جدا شدن جفت در مرحله‌ی سوم زایمان کدام است؟
- ۱- خونریزی واژینال ۲- افزایش طول بندناف ۳- سفت و کروی شدن رحم ۴- ظاهر شدن جفت در مدخل واژن
- ۱۲۳- دلیل زیاد بودن ترشح ادرار در روز اول بعد از زایمان کدام است؟
- ۱- دریافت سرم به مقدار زیاد ۲- شل شدن مثانه ۳- خارج شدن مایع بین سلولی ۴- عفونت ادراری
- ۱۲۴- برای پیشگیری از پره‌اکلامپسی، رژیم غذایی مادر باید حاوی کدام مورد باشد؟
- ۱- سدیم ۲- کلسیم ۳- فسفر ۴- ید
- ۱۲۵- عامل مستعد کننده جدا شدن زودرس جفت کدام است؟
- ۱- افزایش فشار خون ۲- عفونت لوله‌های رحمی ۳- اختلال کروموزومی ۴- وجود جای زخم در رحم
- ۱۲۶- در پرستاری از بیمار مبتلا به گاستریت حاد کدام یک از موارد زیر اولویت دارد؟
- ۱- رژیم غذایی ساده ۲- پرهیز از مصرف غذای چرب ۳- گذاردن لوله معده جهت کم کردن فشار ۴- ناشتا تا رفع تهوع و استفراغ

۱۲۷- شایع ترین علت اختلال در خواب و استراحت در بیماران جسمی بستری در بیمارستان کدام است؟

۱- درد ۲- عوارض دارویی ۳- سروصدای محیط ۴- تنهایی

۱۲۸- در آموزش به بیمار آرتریت روماتوئید، کدام یک از موارد زیر را توصیه می‌نمایید؟

۱- حفظ حرارت مفصل مبتلا ۲- بی حرکتی مفصل ۳- مصرف مایعات فراوان ۴- محدود کردن مایعات

۱۲۹- پس از دوره‌ی دیورتیک نارسایی حاد کلیه، پرستار افزایش چه مواردی را در رژیم غذایی به بیمار توصیه کند؟

۱- پتاسیم ۲- پروتئین ۳- کربوهیدرات ۴- سدیم

۱۳۰- کدام یک از موارد زیر شاخص دقیق تری از وضعیت حجم مایعات بدن می‌باشد؟

۱- فشار خون شریانی ۲- سرعت و شدت نبض ۳- فشار ورید مرکزی ۴- برون‌ده ادراری

۱۳۱- به علت محدودیت زمانی در درمان ایست قلبی تنفسی، کدام دارو را می‌توان از طریق تراشه به بیمار داد؟

۱- لیدوکائین ۲- پی‌نفرین ۳- مورفین ۴- نیفیدپین

۱۳۲- کدام یک از موارد زیر، به ترتیب سیکل ایجاد عفونت می‌باشد؟

۱- محل خروج، عامل، مخزن، راه انتقال، راه ورود، مخزن، محل خروج، راه انتقال، عامل، میزبان مستعد

۳- عامل، مخزن، محل خروج، راه انتقال، راه ورود، میزبان مستعد ۴- عامل، محل خروج، راه انتقال، مخزن، راه ورود، میزبان مستعد

۱۳۳- شایع ترین تشخیص پرستاری در بیمار قبل از عمل جراحی قلب کدام مورد زیر است؟

۱- کاهش برون‌ده قلب ۲- کمبود آگاهی ۳- اضطراب ۴- عدم تحمل فعالیت

۱۳۴- در درمان کدام یک از دیس ریتمی‌های زیر، تعبیه پیس میکاندیكاسیون دارد؟

۱- بلوک موبیتر تیپ یک ۲- بلوک شاخه راست ۳- بلوک کامل دهلیزی بطنی ۴- بلوک شاخه چپ

۱۳۵- علت خارش در بیمارای نارسایی مزمن کلیه کدام است؟

۱- هیپرناترمی ۲- هیپرکلمی ۳- هیپرکالمی ۴- هیپرفسفاتمی

۱۳۶- اولین اقدام برای گرفتن نمونه خون شریانی برای ABG کدام است؟

۱- بررسی وضعیت عروق جانبی ۲- گرم کردن اندام‌ها ۳- کنترل نبض و تنفس ۴- بالا قرار دادن اندام‌ها

۱۳۷- شایع ترین نوع سردرد کدام است؟

۱- میگرن ۲- تنشی ۳- ضربه‌ای ۴- خوشه‌ای

۱۳۸- در آموزش به بیمار مبتلا به منبر در رابطه با رژیم غذایی، کدام یک از موارد زیر را پرستار توصیه می‌کند؟

۱- کم چربی ۲- کم سدیم ۳- کم کربوهیدرات ۴- پرپروتئین

۱۳۹- شیر خوار به کدام یک از رفتارهای تکاملی زیر زودتر دست می‌یابد؟

۱- توجه به صداها یا ایجاد شده در سطح گوش ۲- برگرداندن سر در جهت منبع صدا ۳- تکامل درک عمق بینایی ۴- شروع هماهنگی بین دست و چشم

۱۴۰- تاثیر بازی بر اجتماعی شدن کودک از طریق چه گروهی صورت می‌گیرد؟

۱- مادر ۲- پدر ۳- معلمین ۴- همسالان

۱۴۱- جهت پیشگیری از ابتلای کودکان با اوتیت میانی، توصیه پرستار به والدین کدام است؟

۱- تمیز کردن مکرر واکس گوش ۲- انجام اودیومتری هر ۶ ماه ۳- مصرف قطره‌های ولرم در گوش ۴- پیشگیری از سرماخوردگی

۱۴۲- مهم ترین هدف پرستار در مراقبت از نوزاد مبتلا به آترزی مری کدام است؟

۱- برقراری تغذیه مناسب ۲- پیشگیری از آسپیراسیون ۳- پیشگیری از بروز کم آبی ۴- جلوگیری از اتساع شکم

۱۴۳- تعریف فرد سالم از نظر روانی کدام است؟

۱- سرمشق قرار دادن رفتار دیگران ۲- همگان را راضی نگه داشتن ۳- برآوردن نیازهای اساسی خود ۴- داشتن بصیرت نسبت به مشکلات خویش

۱۴۴- نسبت دادن احساس‌های نامقبول خود به دیگران معرف استفاده از کدام مکانیسم دفاعی است؟

۱- فرافکنی ۲- خیال پردازی ۳- جابجایی ۴- درون فکنی

- ۱۴۵- در مواجهه شدن با عقاید هذیانی بیمار بهترین اقدام پرستاری کدام است؟
- ۱- انکار عقاید هذیانی با برخورد جدی ۲- اصلاح آن با منطق و استدلال ۳- تمرکز بر واقعیت و ایجاد شک در بیمار ۴- تایید عقاید بیمار جهت حفظ ارتباط با وی
- ۱۴۶- کلیه وارد زیر برخورد مناسب پرستار با بیمار در هنگام حمله هراس می‌باشد، به استثنای:
- ۱- داشتن رفتاری آرام و کنترل شده ۲- تشویق بیمار به صحبت کردن ۳- ارزیابی واکنش‌های رفتاری بیمار ۴- تشویق بیمار به تنفس عمیق و آرام
- ۱۴۷- مهم‌ترین مزیت گوش دادن به عنوان یکی از تکنیک‌های ارتباط درمانی کدام است؟
- ۱- تشویق بیمار برای ادامه‌ی صحبت ۲- ارزیابی صحبت‌های بیمار
- ۳- روشی آسان و مقرون به صرفه ۴- به عنوان عکس‌العملی به صحبت‌های بیمار
- ۱۴۸- کدام یک از مراقبت‌های زیر بعد از ECT ضروری است؟
- ۱- گرفتن EKG ۲- کنترل Gag reflex ۳- کنترل فشار خون ۴- تجویز آرام بخش
- ۱۴۹- کدام یک از واکنش‌های زیر به نور، گرما و ضربه حساس‌تر است؟
- ۱- ثلاث ۲- هیپاتیت ۳- توام ۴- سرخک
- ۱۵۰- وقوع بیش از حد انتظار یک بیماری در یک ناحیه‌ی جغرافیایی چه نامیده می‌شود؟
- ۱- اسپورادیک ۲- پیدمی ۳- آندمی ۴- پاندمی
- ۱۵۱- کدام روش در رابطه با زباله‌های بیمارستانی کاربرد بیشتری دارد؟
- ۱- تخمیر و تهیه کود ۲- دفن بهداشتی ۳- سوزاندن ۴- احیاء و بازیابی
- ۱۵۲- پرتوهای یون ساز جزء کدام دسته از عوامل بیماری زای شغلی می‌باشند؟
- ۱- بیولوژیکی ۲- فیزیکی ۳- مکانیکی ۴- شیمیایی
- ۱۵۳- کدام یک از فعالیت‌ها در سطح روستها اولویت دارند؟
- ۱- بهداشت مدارس ۲- بهداشت روانی ۳- بهداشت سالمندان ۴- بهسازی محیط
- ۱۵۴- عامل مستعد کننده‌ی ناهنجاری‌های کروموزومی کدام است؟
- ۱- سن بالای ۳۵ سال مادر ۲- والدین با ژن جهش یافته ۳- جهش یک ژن در محل مشخص ۴- سن بالای پدر
- ۱۵۵- در غذای روزانه‌ی زنان حامله، میزان کدام ماده معدنی باید بیشتر از همه باشد؟
- ۱- روی ۲- منیزیم ۳- آهن ۴- کلسیم
- ۱۵۶- در بی حسی پاراسرویکال به کدام عارضه توجه دارید؟
- ۱- افت فشار خون ۲- برادی کاردی جنینی ۳- عدم احساس فشار در لگن ۴- سردرد
- ۱۵۷- تغییرات فیزیولوژیک در هنگام زایمان کدام است؟
- ۱- افزایش بازده قلبی ۲- کوتاه شدن زمان تخلیه‌ی معده ۳- کاهش حجم ادرار ۴- افزایش وزن
- ۱۵۸- در فلج ارب دوشن (Erb- Duchenne) کدام رفلکس از بین می‌رود؟
- ۱- تونیک گردن ۲- قدم برداشتن ۳- مکیدن ۴- مورو
- ۱۵۹- شایع‌ترین علت اختلالات انعقادی در کدام مورد زیر است؟
- ۱- سقط عاداتی ۲- حاملگی خارج از رحم ۳- جفت سرراهی ۴- جدا شدن زود رس جفت
- ۱۶۰- عامل مستعد کننده‌ی زایمان زودرس کدام است؟
- ۱- اولیگوهایدروآمیونیوس ۲- پیلونفریت ۳- مادران چاق ۴- نمایش عرضی جنین
- ۱۶۱- چه وضعیتی را برای بیماری که دچار فتق هیاتال می‌باشد، توصیه می‌نمایید؟
- ۱- طاقباز ۲- نیمه نشسته ۳- به پهلو چپ ۴- تفاوتی نمی‌کند
- ۱۶۲- به دنبال بیوپسی کبد، مناسب‌ترین وضعیت کدام مورد زیر است؟
- ۱- به پهلو چپ ۲- به پشت ۳- به پهلو راست ۴- نشسته

۱۶۳- مشاهده‌ی موج U در نوار الکتروکاردیوگرام، نشان دهنده‌ی کدام اختلال زیر می‌باشد؟

۱- کمبود سدیم سرم ۲- کمبود پتاسیم سرم ۳- کمبود کلسیم سرم ۴- افزایش منیزیم سرم

۱۶۴- به هنگام ترانسفوزیون، کدام یک از اقدامات زیر موجب همولیز شدن خون می‌گردد؟

۱- استفاده از سوزن بزرگ برای تزریق ۲- ترانسفوزیون آهسته خون ۳- تکان دادن و فشردن کیسه خون ۴- استفاده از ست فیلتردار

۱۶۵- مناسب‌ترین محل ریختن قطره‌ی چشمی در کدام یک از موارد زیر است؟

۱- مستقیماً روی قرنیه ۲- داخل کانتوس داخلی ۳- داخل ساک ملتحمه تحتانی ۴- داخل کانتوس خارجی

۱۶۶- دمیدن در فضای بسته در کدام یک از حالات ذیل توصیه می‌شود؟

۱- الکلوز تنفسی ۲- آکالوز متابولیک ۳- اسیدوز تنفسی ۴- اسیدوز متابولیک

۱۶۷- مهم‌ترین اهداف توان‌بخشی عبارت است از :

۱- آموزش به جامعه جهت جلوگیری از معلولیت ۲- افزایش توان اقتصادی جامعه

۳- تسکین دردهای جسمی و مشکلات روانی ۴- استقلال فردی بیمار در انجام کارهای روزمره

۱۶۸- کدام یک از داروهای ضد سل، موجب آسیب به عصب شنوایی می‌گردد؟

۱- یزونیازید ۲- استرپتومایسین ۳- پنی‌سیلین ۴- تامبوئال

۱۶۹- استفاده از اکسیژن با درصد بالا، در کدام یک از موارد زیر خطر آفرین است؟

۱- هیپوکسی شدید ۲- انسداد مزمن ربوی ۳- آدم حاد ریه ۴- نارسایی احتقانی ریه

۱۷۰- در کدام از اختلالات ریتمیک زیر، از شوک سینکرونایز استفاده می‌شود؟

۱- تاکی کاردی بطنی ۲- فیبریلاسیون بطنی ۳- فلوتر بطنی ۴- ایست قلبی

۱۷۱- عدم شناسایی و اصلاح به موقع کدام عیوب چشمی می‌تواند منجر به نقص بینایی گردد؟

۱- نزدیک بینی ۲- دوربینی ۳- آستیگماتیسم ۴- استرابیسم

۱۷۲- در نوزاد مبتلا به مننژومیلوسل، مشاهده‌ی کدام مورد تهدید کننده باید فوراً گزارش شود؟

۱- سوراخ شدن ساک و نشست مایع مغزی نخاعی ۲- ترشح چرکی در اطراف ساک ۳- افزایش غیر قابل انتظار دور سر ۴- احتباس ادرار

۱۷۳- با مشاهده‌ی کدام علامت، درمان با سولفات منیزیم باید قطع شود؟

۱- افزایش فعالیت رفلکس ۲- اختلال بینایی ۳- اختلال تنفسی ۴- تشنج

۱۷۴- اقدام ضروری در نوزاد مبتلا به فلج عصب دیافراگم کدام است؟

۱- خوابانیدن نوزاد به روی شکم ۲- تحریک نوزاد برای نفش کشیدن ۳- تغذیه نوزاد از راه دهان ۴- خوابانیدن نوزاد به پهلو مبتلا

۱۷۵- مشاهده‌ی کاهش متغیر در ضربان قلب جنین به کدام دلیل است؟

۱- فشار انقباضات رحم بر سر جنین ۲- عدم کفایت جفت ۳- نمایش غیر طبیعی جنین ۴- فشرده شدن بند ناف

۱۷۶- منع استفاده از تست ایجاد تنش (Stress test) کدام است؟

۱- مادران دیابتیک ۲- حاملگی چند قلو ۳- مادران قلبی ۴- حاملگی دیررس

۱۷۷- مهم‌ترین اقدام پرستار بعد از عمل لوزه برداری کدام است؟

۱- مشاهده‌ی مستقیم حلق ۲- گزارش فوری بلع مکرر ۳- اندازه‌گیری درجه حرارت ۴- دادن مایعات

۱۷۸- در آموزش به کودک مبتلا به آسم بر کدام نکته باید تاکید شود؟

۱- نیاز به دارو درمانی فقط در صورت بروز حمله ۲- پیشگیری از ابتلا به عفونت‌های تنفسی ۳- به حداقل رساندن فعالیت‌های فیزیکی ۴- تنفس دهانی در هوای سرد

۱۷۹- اقدام مناسب پرستاری از بیمار با اعتماد به نفس پایین، کدام است؟

۱- تاکید بر توانایی‌ها و نکات مثبت بیمار ۲- تمرکز دادن بر نقاط ضعف بیمار ۳- تشویق به مقایسه‌ی خود با دیگران ۴- تشویق به افزایش فعالیت‌های اجتماعی

۱۸۰- توهم در بیمار، نتیجه‌ی اختلال در کدام قسمت است؟

۱- حافظه ۲- درک ۳- خلق و خوی ۴- هوشیاری

۱۸۱- در مداخلات پرستاری از بیماران با اختلالات تبدیلی مورد صحیح کدام است؟

۱- برخورد قاطع و با محبت به بیمار ۲- توجه به علایم کاذب بیمار ۳- دادن آزادی عمل بیشتر به بیمار ۴- فراهم کردن فرصت ابراز وجود و جلب توجه

۱۸۲- احتمال بروز عارضه‌ی آگرانولوسیتوز با مصرف کدام داروی زیر به وجود می‌آید؟

۱- کلرپرومازین ۲- کلونازپام ۳- هالوپریدول ۴- کلوزاپین

۱۸۳- در بیماری که لارگاکتیل دریافت می‌نماید، رعایت کدام توجه پرستاری ضروری است؟

۱- کنترل عارضه‌ی تاری دید ۲- حذف دارو هنگام خواب ۳- کنترل نبض رادیال ۴- کنترل فشار خون قبل از دادن دارو

۱۸۴- بیماران افسرده از کدام یک از مکانیسم‌های دفاعی زیر بیشتر استفاده می‌نمایند؟

۱- برون‌فکنی ۲- تصعید ۳- درون‌فکنی ۴- انکار

۱۸۵- کدام یک از موارد زیر وسیله‌ی تشخیص قطعی بیماری سل ریوی می‌باشد؟

۱- تست توبوکولی ۲- علایم بالینی ۳- آزمایش خون ۴- کشت خلط

۱۸۶- هدف ارگونومی کدام است؟

۱- پیشگیری از حوادث ناشی از کار ۲- بررسی مشکلات جسمی کارگران ۳- بررسی مشکلات روانی کارگران ۴- متناسب کردن کار برای کارگران

۱۸۷- عامل فعال و زیان آور اسموگ (Smog) اکسیدکننده کدام است؟

۱- گوگرد ۲- ازن ۳- پان ۴- کگربن

۱۸۸- همبستگی در گروه عبارت است از :

۱- سازش بین اهداف شخصی و اهداف گروهی ۲- دفاع از گروه در مقابل انتقادهای خارجی

۳- مشارکت در رهبری و اجرای مهارتها ۴- کشش اعضای گروه نسبت به یکدیگر

۱۸۹- فاضلاب تصفیه شده برای چه مصارفی کاربرد دارد؟

۱- کشاورزی- شرب ۲- شرب حیوانات ۳- کشاورزی- مصرف عمومی ۴- صنعت- کشاورزی

۱۹۰- امکان پیدایش بحران تکاملی در کدام یک از مراحل خانواده بیشتر مطرح است؟

۱- فرزنددار شدن ۲- تشکیل خانواده ۳- خانواده یا نوجوان ۴- خانواده در سنین پیری

۱۹۱- کدام یک از عوامل زیر در کاهش میزان سرب هوا بیشتر موثر است؟

۱- گیاهان علفی ۲- درختکاری ۳- بوته‌های بیابانی ۴- مزارع کشاورزی

۱۹۲- رشد سلول‌های دسیدوا به دلیل تاثیر کدام هورمون است؟

۱- استروژن ۲- پروژسترون ۳- پروستاگلاندین ۴- پرولاکتین

۱۹۳- در کنترل ضربان قلب جنین در هنگام زایمان، کدام طبیعی است؟

۱- عدم تغییر پذیری ضربه به ضربه ۲- کاهش دیررس ۳- تاکی کاردی شدید ۴- کاهش زودرس

۱۹۴- وجود دیابت بروز کدام عارضه را تشدید می‌کند؟

۱- نارسایی کلیوی ۲- پرولاپس بند ناف ۳- افزایش فشار خون ۴- نارسایی قلبی

۱۹۵- کدام یک از موارد ذیل در بروز هیپرکالمی کاذب موثر است؟

۱- استفاده از مواد غذایی پرپتاسیم ۲- ورزش دادن عضو قبل از خون‌گیری ۳- استفاده از دسیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم ۴- بستن تورنیکت سفت به مدت طولانی

۱۹۶- با توجه به معیار گلاسکو، امتیاز ۵ به کدام یک از حالات زیر در خصوص واکنش‌های حرکتی تعلق می‌گیرد؟

۱- اطاعت از دستورات حرکتی ۲- عدم واکنش به محرک دردناک ۳- لوکالیزه کردن منطقه‌ی دردناک ۴- عقب‌نشینی عضو با تحریک دردناک

۱۹۷- حفظ وضعیت نیمه نشسته در مددجویانی که عمل جراحی مری در آنها صورت گرفته، به کدام منظور زیر استفاده می‌شود؟

۱- پیشگیری از بروز عفونت و خونریزی ۲- کاهش خطر آسپیراسیون ۳- حفظ ونتیلیاسیون کافی ۴- پیشگیری از بروز نفخ و یبوست

۱۹۸- در آموزش به بیمار تحت عمل جراحی گلوکوم، تاکید پرستار بر کدام است؟

۱- پرهیز از خوابیدن به طرف عمل شده ۲- پرهیز از فعالیت‌های جسمی خفیف ۳- توصیه به فشردن و مالیدن چشم‌ها ۴- توصیه به سرفه‌های مکرر

- ۱۹۹- از نظر پرستاری، شایع‌ترین علت بروز علائمی چون احساس فشار، درد مستمر و آدم در عضو گچ گرفته، مربوط به کدام است؟
- ۱- اتساع کانال گچی ۲- ضایعه ترومبوآمبولی ۳- قطع عصب شکسته ۴- سندرم کمپارتمنت
- ۲۰۰- مهم‌ترین نقش پرستار در تامین رژیم غذایی بیماران مبتلا به آدیسون کدام است؟
- ۱- تامین پتاسیم کافی ۲- تامین سدیم کافی ۳- استفاده از کربوهیدرات کافی ۴- استفاده از پروتئین کافی
- ۲۰۱- به نظر شما شایع‌ترین عارضه جانبی در مددجویان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی کدام است؟
- ۱- تهوع و استفراغ ۲- نارسایی کلیه ۳- خونریزی ۴- ضایعه‌ی عصبی
- ۲۰۲- در بیماری که مبتلا به هموفیلی A می‌باشد، کدام یک از فرآورده‌های زیر ترانسفوزیون می‌گردد؟
- ۱- پلاسما تاز منجمد ۲- آلبومین تازه ۳- فاکتور هشت ۴- خون کامل
- ۲۰۳- تراکشن استخوانی است، پرستار به کدام علائم زیر باید توجه کند؟
- ۱- خونریزی ۲- عفونت ۳- شکستگی استخوان ۴- حساسیت پوست
- ۲۰۴- در کدام یک از مراحل رشد و تکامل، رشد تنه محسوس‌تر است؟
- ۱- جنینی و شیرخوارگی ۲- شیرخوارگی و نوپایی ۳- قبل از مژسه و مدرسه ۴- شیرخوارگی و بلوغ
- ۲۰۵- مناسب‌ترین وسیله برای دادن داروهای مایع به کودکان سنین قبل از مدرسه کدام است؟
- ۱- فنجان کاغذی مدرج یک بار مصرف ۲- فنجان پلاستیکی مدرج یک بار مصرف ۳- قاشق چایخوری ۴- قطره چکان
- ۲۰۶- اگر یکی از مفاصل کودک مبتلا به هموفیلی دچار خونریزی شود، اقدام مناسب کدام است؟
- ۱- استراحت و دادن آسپرین برای کاهش درد ۲- بانداژ فشاری و گذاشتن کیسه‌ی آب گرم ۳- بالا نگه داشتن مفصل و گذاشتن کیسه‌ی یخ ۴- بی حرکت کردن مفصل و ماساژ دادن
- ۲۰۷- برای بررسی تعادل مایعات بدن کودک مبتلا به گلومرولونفریت، مفیدترین راه کدام است؟
- ۱- اندازه‌گیری مایعات دفعی ۲- اندازه‌گیری مایعات دریافتی ۳- بررسی شدت آدم ۴- وزن کردن روزانه‌ی کودک
- ۲۰۸- مهم‌ترین اقدام پرستاری، در کودک مبتلا به آسم کدام است؟
- ۱- استراحتن مطلق و پیشگیری از اضطراب ۲- تزریق زیر جلدی اپی‌نفرین ۳- تزریق عضلانی هیدروکورتیزن ۴- اسپری سالبوتامول همراه با اکسیژن تراپی
- ۲۰۹- کودک مبتلا به سندرم نفروتیک تحت درمان با پرئنیزولون است. توصیه‌ی پرستار به والدین کودک کدام است؟
- ۱- عدم تماس با افراد مبتلا به عفونت-ها ۲- کنترل مرتب فشار خون ۳- استراحت در تخت ۴- قطع دارو در صورت چاقی
- ۲۱۰- کدام یک از موارد زیر در شش ساعت اولیه بعد از ECT باید مورد توجه پرستار قرار گیرد؟
- ۱- بی‌قراری ۲- خواب ۳- تشنگی ۴- افزایش فشار خون
- ۲۱۱- مشکل اعتماد به نفس در کدام یک از دوران‌های تکاملی بیشتر شیوع دارد؟
- ۱- دوران مدرسه ۲- جوانی ۳- نوجوانی ۴- میانسالی
- ۲۱۲- قطع ارتباط با واقعیت‌ها در کدام مورد مشاهده می‌شود؟
- ۱- وسواس ۲- ترس مرضی ۳- اختلال تبدیلی ۴- اسکیزوفرنی
- ۲۱۳- خستگی، مربوط به کدام یک از علائم و نشانه‌های اضطراب به شمار می‌آید؟
- ۱- هیجانی ۲- جسمانی ۳- شناختی ۴- ذهنی
- ۲۱۴- در رابطه با بیماری که دچار هذیان است، اقدام پرستاری مناسب کدام است؟
- ۱- انکار عقاید هذیانی ۲- قول دادن در مورد از بین رفتن علائم ۳- پذیرش عقاید هذیانی ۴- تاکید و تقویت واقعیت
- ۲۱۵- استفاده‌ی طولانی مدت از لیتیم باعث چه عارضه‌ی می‌شود؟
- ۱- کاهش وزن ۲- هیپوتیروئیدیسم ۳- هیپرگلیسمی شدید ۴- یبوست
- ۲۱۶- علائم شناختی واکنش‌های روانی در بحران کدام است؟
- ۱- مشکل در تصمیم‌گیری ۲- احساس مغلوب شدن ۳- تغییر در عادات غذایی ۴- نوسان در فشار خون

۲۱۷- در کدام اختلال، بی نظمی در میزان سروتونین وجود دارد؟

۱-حمله هراس ۲-استرس پس از سانحه ۳-ترس ۴-وسواس جبری

۲۱۸- هدف اصلی از توانبخشی بیماریهای مزمن روانی کدام است؟

۱-اجتماعی کردن ۲-بهبود اعتماد به نفس ۳-ترغیب به خوداتکایی ۴-افزایش انگیزه

۲۱۹- مهم ترین نقش پرستار در تیم بهداشتی در مراحل پایانی بلایای طبیعی کدام است؟

۱-تدارک پرسنل، امکانات و تجهیزات ۲-بررسی وضعیت جغرافیایی منطقه

۳-برآوردن منابع مالی مورد نیاز ۴-پیشگیری از بیماریها و کنترل آب آشامیدنی

۲۲۰- در بررسی وضعیت سلامت جامعه، کدام شاخصهای ویژه مدنظر قرار می گیرد؟

۱-امکانات بهداشتی بیمارستان و خانههای سالمندان ۲-روزهای بستری بیمار در بیمارستان، الگوهای استفاده از منابع بهداشتی

۳-تولد زنده، مرگ و میر نوزادان، کودکان و مادران ۴-امکانات و تجهیزات بهداشتی مدارس و مراکز بهداشتی

۲۲۱- در کدام یک از مراحل بازدید منزل، پرستار تعامل مستقیم با مددجو برقرار می کند؟

۱-ثبت داده ها ۲-حضور در منزل ۳-جمع آوری داده ها ۴-قبل از بازدید

۲۲۲- کارگران کارخانجات رنگ و صنایع پلاستیک، بیشتر در معرض کدام یک از سرطانهای زیر قرار دارند؟

۱-مثانه ۲-پوست ۳-پروستات ۴-دستگاه گوارش

۲۲۳- خانم اصغری در بخش داخلی پذیرش و بستری گردیده است. اولین اقدام پرستار کدام است؟

۱-اطلاع به پزشک ۲-مطالعهی سوابق پزشکی بیمار ۳-معاینهی فیزیکی اندامهای فوقانی ۴- بررسی نیازهای بیمار

۲۲۴- پرستار در آموزش به مددجویان در خصوص علایم اولیه سرطان دستگاه گوارش ادراری، کدام علامت را مورد توجه قرار می دهد؟

۱-خونریزی ادراری بدون درد ۲-وجود توده در ناحیهی پهلوی ۳-ترشحات دستگاه ادراری ۴-عفونتهای مکرر ادراری

۲۲۵- انفوزیون کلرور پتاسیم در کدام یک از اختلالات زیر کاربرد دارد؟

۱-بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه ۲-کودک مبتلا به اسهال و استفراغ حاد ۳-کودک دچار سوختگی درجه ۲ ۴-بیمار دچار افزایش فشار داخل جمجمه

۲۲۶- بهترین زمان شروع تغذیه تکمیلی برای شیرخواران کم وزن کدام است؟

۱-قبل از پایان ۴ ماهگی ۲-پس از دو برابر شدن وزن هنگام تولد ۳-پس از ۶ ماهگی ۴-بعد از تحمل اولین تغذیه تکمیلی

۲۲۷- کدام یک از موارد زیر، نقش تولید کننده در اکوسیستم دارد؟

۱-جانوران ۲-مواد معدنی ۳-نور خورشید ۴-گیاهان

۲۲۸- مصرف داروها در کدام دوره از بارداری موجب ناهنجاری ساختاریهای در جنین می شوند؟

۱-تخم ۲-قبل از لانه گزینی ۳-رویای ۴-جنین

۲۲۹- مراقبت پرستاری بلافاصله پس از تولد کدام است؟

۱-استفاده از پماد ایترومایسین چشمی ۲-شستن محل بند ناف با بتادین ۳-برقراری تماس مادر و نوزاد ۴-ارزیابی رفلکسهای نوزاد

۲۳۰- مراقبت پرستاری در بی حسی اپیدورال (Epidural) با توجه به عارضهی شایع آن کنترل کدام است؟

۱-ضربان قلب جنین ۲-میزان سردرد ۳-فشار خون مادر ۴-جذب و دفع

۲۳۱- تامین اولیه گرمای بدن نوزاد توسط کدام است؟

۱-لرزیدن ۲-چربی قهوه ای ۳-ورنیکس ۴-انقباض عروقی

۲۳۲- اختلال انعقادی شدید در کدام سقط دیده می شود؟

۱-تهدید به سقط ۲-فراموش شده ۳-ناقص ۴-عادی

۲۳۳- مراقبت پرستاری در زایمان غیر طبیعی کدام است؟

۱-ارزیابی ویژگی انقباضات رحمی ۲-کنترل جذب و دفع ۳-ارزیابی سلامت جنین با روش Nonstress test ۴-تشویق مددجو به راه رفتن

۲۳۴- توصیهی مراقبتی برای مبتلایان به فیبروز سیستیک (Cystic fibrosis) که به تخلیهی ترشحات ریوی کمک کند کدام است؟

- ۱- مصرف حجم مایعات کافی ۲- آنتی بیوتیک تراپی ۳- استفاده از رژیم پر کالری ۴- ۰ استراحت کافی
- ۲۳۵- در سندرم ازدیاد ترشح هورمون ضد ادراری (SIADH)، اقدام مناسب پرستاری کدام است؟
- ۱- مصرف هورمون های جایگزین ۲- افزایش مایعات دریافتی ۳- محدود کردن مایعات دریافتی ۴- گنجاندن شدید کافی ندر رژیم بیمار
- ۲۳۶- کدام یک از داروهای زیر بایستی بعد از عمل جراحی تیروئیدکتومی در کنار بیمار باشد؟
- ۱- کلسیم گلوکونات ۲- آمینوفیلین ۳- آدرنالین ۴- آتروپین
- ۲۳۷- کدام یک از پوزیشن های زیر ثر حمله ی حاد فئوکرومسیتوما مناسب است؟
- ۱- خوابیده به پشت (طاقباز) ۲- وضعیت شوک ۳- خوابیده به روی شکم (دمر) ۴- نیمه نشسته
- ۲۳۸- Life expectancy به معنای چیست؟
- ۱- حداکثر سالهایی که فرد انتظار دارد بدون بیماری زندگی کند ۲- مجموع سالهایی که فرد دچار بیماری می شود
- ۳- متوسط سالهایی که فرد انتظار دارد زنده بماند ۴- حداقل مدت زنده ماندن نلامیده می شود
- ۲۳۹- مهم ترین هدف پایش رشد کودکان در جامعه کدام است؟
- ۱- افزایش امید به زندگی ۲- تهیه نمودار رشد کودکان ۳- مقایسه وزن و قد کودکان ۴- کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۱ سال
- ۲۴۰- گردش خون رحمی- جفتی را کدام مورد کاهش می دهد؟
- ۱- فشار بر بند ناف ۲- افزایش فشار خون مادر ۳- فشار بر سر جنین ۴- پارگی کیسه آب
- ۲۴۱- مشخصات لوشیا رابرا (lochia Rubra) کدام است؟
- ۱- قرمز روشن به مدت ۳ روز اول ۲- صورتی به مدت ۱۰ روز اول ۳- سفید رنگ در هفته سوم ۴- قهوه ای در هفته ششم
- ۲۴۲- نقش استروژن در دوران حاملگی کدام است؟
- ۱- حفظ حاملگی ۲- تحریک رشد رحم ۳- کمک به رشد جفت ۴- تحریک مایع آمنیوتیک
- ۲۴۳- تغییرات سیستم قلبی عروقی در دوران حاملگی کدام است؟
- ۱- کاهش بازده قلبی ۲- افزایش گلبول های سفید ۳- افزایش فشار خون ۴- افزایش زمان انعقاد خون
- ۲۴۴- انتظار می رود حالت روانی مددجو در سه ماهه دوم حاملگی کدام مورد باشد؟
- ۱- آمادگی برای زایمان ۲- پذیرش بارداری ۳- پذیرش جنین ۴- توجه به حاملگی خود
- ۲۴۵- دلیل بیبوست در دوران حاملگی ممکن است کمبود کدام مورد باشد؟
- ۱- کالری دریافتی ۲- ویتامین دریافتی ۳- خواب و استراحت ۴- ورزش
- ۲۴۶- هدف از آموزش تمرینات تنفسی در دوران بارداری کدام است؟
- ۱- کاهش انقباضات رحمی ۲- ایجاد تن آرامی مادر ۳- افزایش ظرفیت تنفسی ۴- بهبود گردش خون
- ۲۴۷- مصرف کدام یک از داروهای زیر در گلوکوم با زاویه بسته ممنوع است؟
- ۱- سولفات آتروپین ۲- گلیسیرین خوراکی ۳- مانیتول ۴- استازولامید
- ۲۴۸- مهم ترین و شایع ترین عامل موثر در بروز بیماری سیروز، کدام است؟
- ۱- الکل ۲- داروها ۳- سوء تغذیه ۴- انسداد صفرا
- ۲۴۹- پدیده ی خاک خواری و اختلال گوارشی-عصبی در کدام یک از بیمار های زیر دیده می شود؟
- ۱- تالاسمی ۲- آنمی فقر آهن ۳- آنمی داسی شکل ۴- هموفیلی
- ۲۵۰- به عنوان پرستار در مراقبت از بیماران بستری در بخش شیمی درمانی، انجام کدام یک از آزمایش های دوره ای زیر را توصیه می کنید؟
- ۱- اوره و اسید اوریک، کراتینین ۲- قند و چربی خون ۳- آزمایشات کامل ادرار ۴- فرمول کامل شمارش خون و پلاکت
- ۲۵۱- در صورت تزریق تتابولین پس از ایجاد زخم، کدام نوع ایمنی در بدن به وجود می آید؟
- ۱- ایمنی فعال غیر طبیعی ۲- ایمنی فعال تدریجی ۳- ایمنی غیرفعال طبیعی ۴- ایمنی غیر فعال مصنوعی
- ۲۵۲- برای تخفیف عوارض تنفسی، پرستار به کدام یک از مبتلایان با اختلال های زیر، تنفس لب غنچه ای را توصیه می کند؟

۱-آسم ۲-برونشیت مزمن ۳-ادم ریوی ۴-نارسایی تنفسی

۲۵۳- در مراقبت پرستاری از بیمار تحت درمان با کومادین یا وارفارین، کدام مورد کنترل می‌شود؟

۱-رنگ ادرار و PTT ۲-HB و PTT ۳-رنگ ادرار و مدفوع و CT ۴-رنگ ادرار و مدفوع و PT

۲۵۴- در دوره‌ی بلوغ، سرعت رشد کدام یک از بخش‌های بدن بیشتر است؟

۱-دور سر ۲-تنه ۳-اندام‌های تحتانی ۴-همه‌ی بخش‌ها به یک نسبت رشد می‌کنند

۲۵۵- الگوی رشد کدام یک از بافت‌های بدن از تولد تا بلوغ، متفاوت از سایر بافت‌ها می‌باشد؟

۱-لنفای ۲-استخوانی ۳-عضلانی ۴-عصبی

۲۵۶- شیر خوار مبتلا به دررفتگی مفصل هیپ تحت درمان با آتل (pavlik harness) به کدام مراقبت نیاز دارد؟

۱-پاشیدن پودر روی پوست نواحی زیر آتل ۲-مالیدن لوسیون روی پوست زیر بندهای آتل

۳-پوشیدن جوراب بلند و پیراهن زیر آتل ۴-چرب کردن بندهای آتل قبل از پوشیدن

۲۵۷- مراقبت پرستاری در درمانیت آتوپیک است؟

۱-استفاده از لباس و ملحفه پشمی ۲-تمیز کردن محل چین و چروک پوست با آب ساده ۳-شستن لباسها با ماده‌ی ضدعفونی قوی ۴-خشک نگه داشتن ضایعات پوستی

۲۵۸- بهترین مایه درمانی در اسهال حاد شیرخواران کدام است؟

۱-کربوهیدرات بالا و الکترولیت پایین ۲-کربوهیدرات پایین و الکترولیت بالا ۳-الکترولیت بالا و کربوهیدرات بالا ۴-الکترولیت پایین و کربوهیدرات پایین

۲۵۹- بی قراری، مربوط به کدام یک از علایم و نشانه‌های اضطراب می‌باشد؟

۱-رفتاری ۲-جسمی ۳-ذهنی ۴-روانی

۲۶۰- بیماران افسرده از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می‌نمایند؟

۱-برون فکنی (Projection) ۲-درون فکنی (Introjection)

۳-تصعید (Sublimation) ۴-بازگشت (Regression)

۲۶۱- عارضه‌ی خونی لکوپنی، با مصرف کدام دارو باید مورد توجه قرار گیرد؟

۱-تیوریدازین ۲-اسکازینا ۳-پرفنازین ۴-لیپونکس

۲۶۲- Aversion therapy در چه گروه از بیماران استفاده می‌شود؟

۱-فوبیا ۲-اعتیاد ۳-وسواس ۴-اختلال عضوی مغز

۲۶۳- کدام یک از مداخلات پرستاری زیر برای بیماران با تشخیص بی‌استهایی عصبی با خود پنداری ضعیف، پیشنهاد می‌گردد؟

۱-فامیل درمانی ۲-دارو درمانی ۳-فرد درمانی ۴-گروه درمانی

۲۶۴- واکسن هپاتیت B در چه سنی باید تزریق شود؟

۱-بعد از سه ماهگی ۲-بدو تولد و شش ماهگی ۳-شش ماهگی ۴-دو سالگی

۲۶۵- کدام یک از گازهای زیر ۶ تا ۸ ساعت پس از مواجهه‌ی فرد، ادم ریوی را موجب می‌شود؟

۱-منواکسید کربن ۲-ازن ۳-دی‌اکسیدکربن ۴-دی‌اکسید گوگرد

۲۶۶- عملکرد خوب خانواده بر پایه‌ی-ی کدام مورد زیر استوار است؟

۱-امکانات مالی مناسب ۲-ارتباط موثر بین اعضا ۳-دانش و آگاهی اعضا ۴-امکانات اجتماعی مناسب

۲۶۷- کدام عارضه در بیمار سرطانی هنگام بیوترپی به صورت معمول اتفاق می‌افتد؟

۱-آلوپسی ۲-دپرسیون مغز استخوان ۳-تشنج ۴-تب و لرز

۲۶۸- در بررسی وضعیت سلامت مددجو برای سنجش کیفیت قدرت نبض، شاخص (Scale) عدم لمس نبض کدام است؟

۱-صفر ۲-یک مثبت ۳-دو مثبت ۴-سه مثبت

۲۶۹- کدام شاخص بیماری دیابت ، بیانگر میانگین میزان قند سرم خون در ماه‌های اخیر است؟

۱-قند خون ناشتا (FPG) ۲-قند ادرار (Urin suger) ۳-قند خون دو ساعت پس از غذا (2hpg) ۴-هموگلوبین گلیکوزیله (Hgb A1C)

- ۲۷۰- بهترین راه پی بردن به مسئله‌ی غیبت دانش آموزان توسط پرستار بهداشت مدارس، کدام است؟
- ۱-گردآوری داده‌ها از آموزگاران و مدیر ۲-برقراری نظام نظارت و موردیابی ۳-پیگیری دانش‌آموزان مراجعه کننده به وی ۴-مصاحبه با دانش‌آموزان مدرسه
- ۲۷۱- بهترین مورد در رابطه با بازدید منزل کدام است؟
- ۱-جایگزین محیط مراقبت است ۲-یک مداخله است ۳-جایگزین موسسات درمانی است ۴-روش پیشگیری است
- ۲۷۲- قرص‌های آهن در دوران بارداری بایستی همراه با کدام مورد مصرف شود؟
- ۱-آنتی اسید ۲-ویتامین A ۳-شیر ۴-ویتامین C
- ۲۷۳- مهم‌ترین دلیل منع استفاده از مسکن‌های مخدر یک ساعت قبل از زایمان، پیشگیری از کدام عارضه است؟
- ۱-وقفه در پیشرفت زایمان ۲-افت فشار خون مادر ۳-وقفه تنفسی در نوزاد ۴-حالت تهوع و استفراغ در مادر
- ۲۷۴- افزایش غیر طبیعی سطح هورمون HCG در کدام حاملگی مشاهده می‌شود؟
- ۱-مول هیداتی فرم ۲-پره‌اکلامپسی ۳-حاملگی نابجه ۴-سقط فراموش شده
- ۲۷۵- رژیم غذایی مادران برای پیشگیری از پره‌اکلامپسی باید بیشتر حاوی کدام مورد باشد؟
- ۱-آهن ۲-ویتامین C ۳-کلسیم ۴-ویتامین B
- ۲۷۶- عامل مستعد کننده جدا شدن زودرس جفت کدام است؟
- ۱-پره‌اکلامپسی ۲-بلند بودن بند ناف ۳-سابقه‌ی جفت سرراهی ۴-مادران نوجوان
- ۲۷۷- درد سه روز اول بعد از تولد، مراقبت از پوست (حمام) نوزاد کدام است؟
- ۱-حمام با صابون‌های قلیایی ۲-مالیدن روغن بعد از حمام ۳-استفاده از پودر بعد از حمام ۴-حمام با آب گرم تنها
- ۲۷۸- پرستار برای کاهش درد اندام تحتانی آمپوته شده بیمار، کدام اقدام زیر را انجام می‌دهد؟
- ۱-گذاشتن کیسه شن زیر اندام آمپوته شده ۲-در وضعیت Prone قرار دادن بیمار ۳-استفاده از تراکشن ۴-بستن آتل
- ۲۷۹- استفاده از کدام گروه غذایی زیر در بیماران مبتلا به نقرس باید محدود شود؟
- ۱-کلم و عدس ۲-مرغ و باقلا ۳-شیرینی و کره ۴-میگو و دل و قلوه
- ۲۸۰- در کدام یک از موارد زیر، انتقال عامل بیماری به صورت مستقیم می‌باشد؟
- ۱-ایدز از طریق تماس جنسی ۲-ایدز از طریق خون آلوده ۳-هپاتیت از طریق تزریق ۴-عفونت از طریق وسایل آلوده
- ۲۸۱- وضعیت بیمار هنگام بروز آمبولی هوا متعاقب IVtherapy چگونه باید باشد؟
- ۱-نشسته کامل ۲-ترندلنبرگ به پهلو چپ ۳-خوابیده به پشت، سر پایین ۴-نیمه نشسته
- ۲۸۲- به رشد سلولی کنترل نشده که مرتبط با نیاز فیزیولوژیک نیز نباشد، چه می‌گویند؟
- ۱-نئوپلازی ۲-متاپلازی ۳-دیسپلازی ۴-آناپلازی
- ۲۸۳- کدام یک از عناصر زیر به طور طبیعی در یک آزمایش تجزیه ادرار دیده نمی‌شود؟
- ۱-گلبول سفید ۲-گلبول قرمز ۳-گلوکز ۴-پروتئین
- ۲۸۴- شایع‌ترین نوع سنگ‌های ادراری کدامند؟
- ۱-منیزیمی ۲-اگزالات کلسیم ۳-سیستینی ۴-اسید اوریکی
- ۲۸۵- درد حاد بعد از عمل جراحی چشم، بیشتر مربوط به کدام عارضه است؟
- ۱-خونریزی ۲-عفونت ۳-افزایش فشار داخل چشم ۴-جدا شدن شبکیه
- ۲۸۶- مهم‌ترین توصیه‌ی پرستار به منظور پیشگیری از بحران آنمی داسی شکل کدام است؟
- ۱-تشویق به خوردن ترکیبات آهن دار ۲-محدودیت در مصرف مایعات ۳-جلوگیری از عفونت، استرس و تنگی نفس ۴-تشویق به تحرک و فعالیت زیاد
- ۲۸۷- مهم‌ترین اصل مورد توجه پرستار در آموزش به بیمار مبتلا به دیابت کدام است؟
- ۱-نحوه‌ی خود مراقبتی ۲-پیشگیری از عوارض ۳-مصرف انسولین ۴-نحوه‌ی تغذیه
- ۲۸۸- چنان چه در حین شستشوی کولستومی، بیمار علائم درد و کرامپ شکمی را اظهار نماید:

- ۱- جریان شستشو را قطع می‌نمایم ۲- جریان مایع شستشو را بیشتر می‌کنیم ۳- جریان مایع شستشو را کاهش می‌دهیم ۴- مایع وارد شده را تخلیه می‌نمایم
- ۲۸۹- مهم‌ترین رفتار ارتقای سلامت که به طور معنادار کیفیت زندگی بیماران مزمن را بهبود می‌بخشد، کدام مورد زیر است؟
 - ۱- رژیم غذایی ۲- تحرک و فعالیت ۳- استراحت ۴- دریافت مایعات
- ۲۹۰- تکامل کدام یک از سینوس‌های پاراناژال در دوره‌ی کودکی صورت می‌گیرد؟
 - ۱- فرونتال و اسفنوئید ۲- ماگزیلاری و اسفنوئید ۳- اتموئید و فرونتال ۴- ماگزیلاری و فرونتال
- ۲۹۱- در بیماری گلودرولونفریت حاد، اندازه‌گیری کدام مورد برای تعیین شدت بیمار و نشانه‌های زودرس عوارض، اهمیت بیشتری دارد؟
 - ۱- علایم حیاتی ۲- وزن ۳- شدت ادم ۴- تغییر رفتار
- ۲۹۲- در شیرخوار مبتلا به اسهال شدید، هدف از مایع درمانی اضطرابی کدام است؟
 - ۱- بهبود جریان خون و فعالیت کلیه‌ها ۲- برطرف کردن کمبود مایعات ۳- برقراری تعادل الکترولیتی ۴- تامین نیازهای تغذیه‌ای
- ۲۹۳- کدام یک از مداخلات زیر به وسیله‌ی پرستار در سطح پایه (Basic level) روان پرستاری انجام می‌شود؟
 - ۱- مورد یابی بیماری ۲- فعالیت‌های خود مراقبتی ۳- توان بخشی ۴- مراقبت فیزیکی
- ۲۹۴- هدف از مداخله در بحران، کدام مورد است؟
 - ۱- بازگرداندن سطح عملکرد به قبل از بحران ۲- حمایت از مددجو برای پذیرش تغییر ۳- کمک به مددجو برای حل مشکل ۴- تقویت مهارت‌های تطابقی در مددجو
- ۲۹۵- کدام مورد از عوارض داروهای سه حلقه‌ای ضدافسردگی نمی‌باشد؟
 - ۱- تاری دید ۲- حساسیت به نور ۳- افزایش وزن ۴- پرفشاری خون
- ۲۹۶- از دست دادن علاقه و انگیزه جزو کدام یک از علایم افسردگی می‌باشد؟
 - ۱- رفتاری ۲- شناختی ۳- عاطفی ۴- فیزیولوژیکی
- ۲۹۷- کدام مورد در ارتباط با بیمار اسکیزوفرن که دچار هذیان است، صحیح می‌باشد؟
 - ۱- تصحیح فکر غلط با دلیل و منطق ۲- تمرکز بر واقعیت و تقویت آن ۳- نادیده گرفتن اعتقادات غلط بیمار ۴- تاکید بر رفع شدن سریع علایم بیماری
- ۲۹۸- کدام یک از تاروهای زیر عارضه‌ی اکستراپیرامیدال ندارد؟
 - ۱- هالوپریدول ۲- فلوپنازین ۳- اسکازینا ۴- کلوزاپین
- ۲۹۹- در نقش‌های گروهی، نقش آغازگر و بیان‌کننده‌ی مشک در کدام دسته‌بندی قرار می‌گیرد؟
 - ۱- وظیفه‌ی ۲- ابقایی ۳- فردی ۴- فردی- ابقایی
- ۳۰۰- هنگامی که بررسی وضعیت سلامت جامعه مدنظر باشد، روش بررسی مناسب کدام است؟
 - ۱- ارزیابی کار مراکز بهداشتی درمانی محل ۲- ارزشیابی فعالیت‌های پرسنل ۳- ارزشیابی فعالیت‌های مشترک مردم و پرسنل ۴- محاسبه‌ی نشانگرهای بهداشتی
- ۳۰۱- مهم‌ترین فعالیت خانواده در تامین نیازهای اعضای خود کدام است؟
 - ۱- حمایت اجتماعی ۲- حمایت اقتصادی ۳- پرورش شخصیت ۴- پرورش استقلال
- ۳۰۲- کدام یک از موارد زیر مهم‌ترین نیاز روانی انسان را نشان می‌دهد؟
 - ۱- امنیت و آسایش خاطر ۲- استراحت و خواب ۳- تفریح و سرگرمی ۴- پرداختن به هنر و زیبایی
- ۳۰۳- مهم‌ترین هدف از پرستاری بیماران وسواسی کدام است؟
 - ۱- گوش دادن به مشکلات روزمره بیمار ۲- کاهش رفتارهای تکراری و پیشگیری از جانشین سازی آنها ۳- متقاعد بیمار در مورد نادرست بودن رفتار وسواسی ۴- مشغول نگاه داشتن دایم بیمار به وسیله‌ی کمک به امور پخش
- ۳۰۴- پس از انجام ECT (شوک الکتریکی)، بیمار نیاز به کدام اقدام دارد؟
 - ۱- بررسی دفع ادرار ۲- کنترل EKG ۳- کنترل رفلکس گگ ۴- تجویز داروی آرام بخش
- ۳۰۵- چنان چه سن کودک هنگام تزریق واکسن MMR ۶-۴ سالگی باشد، نوبت دوم بایستی چه مدت بعد تزریق شود؟
 - ۱- ۳ تا ۴ سال بعد ۲- ۲ تا ۳ سال بعد ۳- ۱ تا ۲ سال بعد ۴- ۶ ماه تا یک سال بعد

۳۰۶- کدام عبارت در خانواده‌های فقیر بیشتر مشاهده می‌شود؟

۱- تقسیم وظایف رسمی ۲- تقسیم وظایف غیر رسمی است ۳- نقش پدر خانواده غیر فعال است ۴- فرزندان ضعیف‌تر دارند

۳۰۷- پرستاری می‌خواهد مصرف روغن جامد را در مبتلایان به آنژین صدری بررسی نماید. روش پژوهش کدام است؟

۱- توصیفی ۲- گذشته‌نگر ۳- آینده‌نگر ۴- تجربی

۳۰۸- عمل قرص‌های ترکیبی پیشگیری از بارداری کدام است؟

۱- محدود کردن ترشح FSH و LH ۲- فعال کردن هیپوتالاموس و غده هیپوفیز ۳- پیگیری از لانه‌گزینی تخم ۴- به تاخیر انداختن تخمک گذاری

۳۰۹- تغییرات دستگاه گوارش در دوران حاملگی کدام است؟

۱- افزایش حرکات ماهیچه‌های صاف ۲- افزایش ترشح اسید کلریدریک معده ۳- کاهش زمان تخلیه‌ی معده ۴- کاهش جذب آب از روده‌ها

۳۱۰- آموزش‌های هنگام ترخیص به مادران پس از سقط جنین کدام است؟

۱- مراجعه‌ی فوری در صورت لکه‌بینی ۲- استفاده از تامپون واژینال ۳- پیشگیری از بارداری به مدت دو سال ۴- داشتن استراحت بیشتر

۳۱۱- دلیل افزایش درجه حرارت مادر در ۲۴ ساعت اول پس از زایمان، کدام است؟

۱- عفونت‌های ادراری ۲- اندومتريت ۳- کمبود مایعات ۴- اندوه پس از زایمان

۳۱۲- توصیه‌ی شما به مادران با مشاهده‌ی علائم زایمان زودرس کدام است؟

۱- استراحت به پهلوی چپ به مدت یک ساعت ۲- انجام فعالیت‌های سبک ۳- استفاده از دوش آب گرم ۴- شمارش حرکات جنین به مدت یک ساعت

۳۱۳- مراقبت پرستاری قبل و حین زایمان با فورسپس کدام است؟

۱- کنترل ضربان قلب جنین ۲- کنترل علائم حیاتی مادر ۳- آموزش تمرینات تنفسی ۴- گزارش پاره شدن کیسه آب

۳۱۴- عارضه‌ی احتمال اکسیژن درمانی در نوزادان نارس کدام است؟

۱- آپنه (Apnea) ۲- رینوپاتی (Retinopathy) ۳- برادی کاردی (Bradycardia) ۴- هپاتومگالی (Hepatomegaly)

۳۱۵- علامت اولیه‌ی استرس سرما (Cold stress) در نوزاد کدام است؟

۱- آپنه ۲- برادی کاردی ۳- کاهش درجه حرارت پوست ۴- کاهش فعالیت جسمی

۳۱۶- از نقطه نظر پرستاری، در کدام یک از ضایعات خونی زیر، احتمال بروز عفونت و خونریزی بیشتر می‌باشد؟

۱- آنمی فقر آهن ۲- آنمی همولیتیک ۳- آنمی آپلاستیک ۴- تالاسمی مینور

۳۱۷- هدف از انجام مراقبت‌های مربوط به گلوکوم، کدام یک از موارد زیر است؟

۱- در اتاق عمل و بلافاصله پس از ماستکتومی ۲- پس از برداشتن بخیه‌ها و بهبود زخم

۳- پس از اتمام دوره‌ی رادیوتراپی و شیمی درمانی ۴- شش ماه تا یک سال پس از جراحی ماستکتومی

۳۱۸- در نظریه‌ی تکامل اخلاقی کوهلبرگ، به کدام مورد کمتر توجه شده است؟

۱- تفاوت‌های فردی ۲- پیشگویی رفتار ۳- گرایش به نظم و قانون ۴- توافق بین شخصی

۳۱۹- رقابت خواهر- برادری در چه سنی بروز بارزی دارد؟

۱- نوپایی ۲- قبل از مدرسه ۳- نوجوانی

۳۲۰- مناسب‌ترین محوریت مراقبت از کودک کدام است؟

۱- پرستار ۲- بیمار ۳- پزشک ۴- خانواده

۳۲۱- مهم‌ترین تدبیر پرستاری در کودکی که در مرحله‌ی تشنج قرار دارد، کدام است؟

۱- دادن اکسیژن ۲- محدود کردن حرکات ۳- اطلاع دادن به پزشک ۴- باز نگه داشتن راه هوایی

۳۲۲- سطح فعالیت کودک مبتلا به سندرم نفروتیک بعد از فروکش شدن ادم کدام است؟

۱- استراحت در تخت تا دو هفته ۲- محدودیت نسبی ۳- کاملاً محدود ۴- فعال مانند گذشته

۳۲۳- مسئولیت مهم پرستار در هنگام بروز حملات صرع کدام است؟

۱- اطلاع دادن به پزشک مسئول ۲- مشاهده‌ی حمله و ثبت دقیق وقایع ۳- محدود کردن حرکات بدنی ۴- رساندن اکسیژن

- ۳۲۴- در نوزادی که تحت فتوتراپی می باشد، توجه به کدام یک از علایم زیر ضروری است؟
- ۱- کم آبی بدن ۲- رنگ پریدگی پوست ۳- هیپوترمی ۴- یبوست
- ۳۲۵- اضطراب سریع ترین واکنش فرد در ارتباط با کدام یک از موارد زیر می باشد؟
- ۱- استرس ۲- فراموشی ۳- پرخاشگری ۴- افسردگی
- ۳۲۶- سطح دوم پیشگیری اختلالات روانی کدام است؟
- ۱- بروز بیماری ۲- توان بخشی ۳- شیوع بیماری ۴- ارتقای سلامت
- ۳۲۷- مهم ترین هدف ارتباط درمانی کدام است؟
- ۱- به کارگیری مهارت ها اجتماعی ۲- تشخیص و در مان بیماری ۳- تغییر الگوی تطابقی غیر موثر ۴- شناسایی و ارزیابی نیازهای بیمار
- ۳۲۸- هدف نهایی توان بخشی از بیمار مزمن روانی کدام است؟
- ۱- افزایش انگیزه ۲- اجتماعی شدن ۳- بهبود اعتماد به نفس ۴- خود اتکایی
- ۳۲۹- برای انجام ECT، مورد مناسب کدام است؟
- ۱- آسیب ستون فقرات ۲- پرفشاری شدید خون ۳- افراد مسن ۴- تومور مغزی
- ۳۳۰- اعتبار آزمون های غربالگری با کدام یک از موارد زیر اندازه گیری می شود؟
- ۱- حساسیت و ویژگی ۲- مثبت واقعی ۳- مثبت و منفی کاذب ۴- منفی واقعی
- ۳۳۱- در مطالعات اپیدمیولوژیک، مثلث اپیدمیولوژیک کدام موارد زیر را در بر می گیرد؟
- ۱- ژنتیک، میزبان و محیط ۲- میزبان، عامل و ژنتیک ۳- میزبان، محیط و عامل ۴- میزبان، حامل و محیط
- ۳۳۲- کارکنان تیم مراقبت در پیشگیری سطح دوم، کدام یک از اقدامات زیر را انجام می دهند؟
- ۱- تشخیص زودرس، درمان به موقع ۲- پیشگیری از ابتلا به بیماری مزمن ۳- تاکید بر غربالگری بیماری های واگیردار ۴- بازتوانی و نوتوانی مددجویان
- ۳۳۳- کارشناسان، کدام انتقاد را بر کاربرد نظریه ی تکاملی خانواده وارد می کنند؟
- ۱- تمرکز بر خانواده های سنتی ۲- توجه زیاد به تغییرات زمان در خانواده ۳- توجه کم به نقش های اعضای خانواده ۴- تمرکز بر وظایف اعضای خانواده
- ۳۳۴- پرستار بهداشت جامعه برای کمک به خانواده، نیاز به دانستن کدام یک از موارد زیر دارد؟
- ۱- ارزش ها و رفتارهای خانواده ۲- ارزش های واقعی خانواده ۳- ارزش های اجتماعی خانواده ۴- ایده آل های مورد نظر خانواده
- ۳۳۵- در محاسبه ی کدام مورد زیر امید به زندگی، با سواد و درآمد سرانه ملاک قرار می گیرد؟
- ۱- پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ۲- سیاست های بهداشتی ۳- توسعه ی انسانی ۴- کیفیت زندگی
- ۳۳۶- پرستار بایستی به مادران حامله که از تکرار ادرار شکایت دارند، توصیه نماید از انجام کدام مورد اجتناب ورزند؟
- ۱- نوشیدن مایعات ۲ لیتر در روز ۲- ورزش Kegel ۳- خوردن ماست و یا فرآورده های آن ۴- نگهداری ادرار جهت تمرین
- ۳۳۷- در ارزیابی مادران Rh منفی برای بررسی احتمال تشکیل انتی بادی، عامل خطر کدام است؟
- ۱- سابقه ی زایمان نوزاد با Rh منفی ۲- وجود جفت سرراهی ۳- انجام آمینوسنتز در حاملگی فعلی ۴- سابقه ی استفاده از IUD
- ۳۳۸- در مادران سیگاری خطر پیدایش کدام عارضه بیشتر است؟
- ۱- عفونت داخل رحمی ۲- از دست دادن انتهاها ۳- سرطان اندام های تناسلی ۴- تاخیر رشد داخل رحمی
- ۳۳۹- در ارزیابی مایع آمیوتیک، وجود کدام مورد را غیر طبیعی می دانید؟
- ۱- قطعات ورنیکس در مایع ۲- رنگ مایع زرد مایل به سبز ۳- خروج مایع با هر انقباض رحم ۴- آغشته بودن مایع به مکنونیوم در نمایش ته
- ۳۴۰- در ارزیابی خونریزی دیررس پس از زایمان، کدام مورد مهم است؟
- ۱- طول مدت زایمان ۲- مقدار مصرف اکسی توسین ۳- سن حاملگی جنین ۴- مقدار مصرف داروهای ضددرد
- ۳۴۱- مهم ترین مانع موثر در سازگاری مادر با نوزاد کدام است؟
- ۱- آگاهی از نیازهای نوزاد ۲- تجربه ی قبلی بچه دار شدن ۳- خستگی مفرط و مزمن ۴- وقایع غیر منظره مثل سزارین

۳۴۲- خطر کدام عارضه در IVF بیش از GIFT است؟

۱- حاملگی چند قلو ۲- سقط ۳- جدا شدن زودرس ۴- حاملگی نابه‌جا

۳۴۳- به چه دلیل مرگ و میر نوزادان دیررس هنگام تولد بالاست؟

۱- افزایش خطر سندرم آسپیراسیون مکنونیوم ۲- ضعف سیستم تنظیم درجه حرارت ۳- جدا شدن زودرس جفت ۴- لزوم استفاده از وسایل جراحی

۳۴۴- در مراقبت پرستاری از بیمار مبتلا به توبرکولوزیس جهت سهولت تخلیه‌ی ترشحات ریه، توصیه‌ی شما کدام است؟

۱- قرار دادن بیمار در وضعیت درناژ ۲- آموزش انجام تنفس‌های تند و عمیق ۳- مصرف مایعات فراوان ۴- عدم مصرف غذاهای محرک

۳۴۵- در چه صورت می‌توان وزنه‌های تراکشن استخوانی بیمار را برداشت؟

۱- در صورت درخواست بیمار ۲- سه نوبت در طی شبانه روز ۳- در شب و به هنگام خواب ۴- وجود شرایط تهدید کننده‌ی زندگی

۳۴۶- در آموزش به بیمار همودیالیزی توصیه شما کدام است؟

۱- انجام ورزش‌های رزمی و هوازی ۲- استراحت کامل قبل از شروع درمان دیالیز

۳- مصرف غذاهای حاوی سدیم پایین و پتاسیم بالا ۴- دریافت مایعات بر اساس ادرار روزانه به اضافه ۵۰۰ CC مایع

۳۴۷- تزریق کدام الکترولیت به صورت هیپرتونیک (رقیق نشده) خطرناک است باید در تمام موارد از آن اجتناب کرد؟

۱- کلسیم ۲- سدیم ۳- پتاسیم ۴- فسفر

۳۴۸- در بیمار تحت شیمی درمانی که دچار استوماتیت توام با کاهش پلاکت می‌باشد، اقدام پرستاری کدام است؟

۱- دهان شویه با محلول گلیسرین و آب لیمو ۲- استفاده‌ی مرتب از مسواک و نخ دندان ۳- شستشوی دهان با سرم فیزیولوژی ۴- استفاده از آنتی‌بیوتیک موضعی

۳۴۹- در بیماری که به علت بیماری پیشرفته عصبی، امکان بهبود کامل (شفا) وجود ندارد، هدف اقدامات پرستاری کدام است؟

۱- تدارک حداکثر آرامش برای بیمار ۲- افزایش ظرفیت ذهنی بیمار ۳- افزایش توان خود مراقبتی بیمار ۴- تدارک رژیم غذایی پر کالری

۳۵۰- در مراقبت از بیمار دیابتیک در رابطه با اثر سوموگی (Somogyi effect) کدام یک از موارد زیر را باید بررسی نمایید؟

۱- سردردهای شبانه ۲- کابوس‌های شبانه ۳- علائم هیپرگلیسمی ۴- دردهای عضلانی

۳۵۱- در مراقبت پرستاری از بیمار دچار پریتونیت، کدام مورد باید مدنظر قرار گیرد؟

۱- کنترل ترشحات تخلیه شده و علائم هیپرولمی ۲- تزریق مایعات هیپرتونیک همراه با مصرف مسکن

۳- کنترل صداهای دودی روده و علائم هیپرولمی ۴- قرار دادن بیمار به پهلو همراه با زانوهای خم شده

۳۵۲- بیماری به علت انسداد مزمن ریوی در بخش بستری و دچار اختلال تنفسی است. الگوی مناسب تنفسی برای این بیمار کدام است؟

۱- تنفس لب‌غنچه‌ای ۲- تنفس عمیق و منظم ۳- تنفس شکمی ۴- تنفس کوتاه و کند

۳۵۳- در مراقبت پوست بیمار تحت رادیوتراپی، چه مواردی را باید به او آموزش داد؟

۱- پوشیدن لباس‌های کتان و پشمی ۲- مصرف دئودورانت در ناحیه‌ی تحت تابش

۳- مصرف ویتامین‌های A و D در موضع ۴- شستشوی مرتب پوست ناحیه در صورت بروز تاول

۳۵۴- کدام یک از موارد زیر در مورد علائم بالینی سندرم کوشینگ صحیح است؟

۱- افزایش قند خون و سدیم و پتاسیم سرم ۲- استئوپروز، احساس سرخوشی، هیرسوتیسم

۳- پوست نازک و شکننده، کاهش ائوزینوفیل سرم ۴- چاقی تنه، آکنه پوستی، دردهای شدیدی عضلانی

۳۵۵- در تزریق فراوان مایعات وریدی که حاوی الکترولیت نیستند (از قبیل سرم قندی ۵٪)، احتمال اختلال در کام الکترولیت بیشتر است؟

۱- پتاسیم ۲- سدیم ۳- کلسیم ۴- فسفر

۳۵۶- در بیمار مبتلا به پنومونی، هدف از مصرف مایعات ((۲-۳ لیتر روزانه)) کدام گزینه است؟

۱- کاهش فشار خون و بار قلب ۲- کاهش تب ۳- کمک به دفع ترشحات ریه ۴- تقویت سیستم ایمنی ضد میکروبی

۳۵۷- برای بهبود تبادلات گازی و تسهل در تخلیه‌ترشحات نواحی دورسال ریه، کدام وضعیت مناسب‌تر است؟

۱- خوابیده به پشت ۲- خوابیده به پهلو ۳- خوابیده به شکم ۴- نیمه نشسته

۳۵۸- رایج‌ترین دیالیز صفاقی کدام است؟

۱-نشت مایع ۲-خونریزی ۳-هیپرولمی ۴-پریتونیت

۳۵۹- کدام یک از پوزیشن‌های زیر برای بیماری که پونکسیون لومبار شده، مناسب است؟

۱-Prone ۲-Supine ۳-Lateral ۴-Semi fowler

۳۶۰- کودک دبستانی در روابط اجتماعی خود به کدام گروه بیشترین گرایش را دارد؟

۱-همسالان هم جنس ۲-همسالان غیر هم جنس ۳-معلمین ۴-والدین

۳۶۱- جهت مراقبت از شیر خواری که تحت عمل جراحی ترمیم شکاف لب قرار گرفته است، رعایت نکته مهم‌تر می‌باشد؟

۱-دادن مایعات وریدی ۲-محدود ساختن حرکات دست ۳-استفاده از بخور ۴-قرار دادن در وضعیت دمر

۳۶۲- در آموزش مصرف دیگوسکین به والدین کودکان، مورد صحیح کدام است؟

۱-مخلوط کردن دارو با آب میوه ۲-گذاشتن دارو در قسمت عقبی و کناری دهان کودک

۳-تکرار دوز دوم در صورت بروز استفراغ ۴-دریافت دارو بعد از فراموش کردن

۳۶۳- کودک مبتلا به سندرم نفروتیک تحت درمان با پردنیزولون است. توصیه‌ی شما به والدین، کدام است؟

۱-کاهش پروتئین مواد غذایی ۲-استراحت مطلق در تخت ۳-کنترل مرتب فشار خون ۴-قطع دارو در صورت بروز چاقی

۳۶۴- کودکی ۵ ساله مبتلا به هیروشیپرونک است. در آموزش به مادر استفاده از کدام محلول را برای تنقیه توصیه می‌کنید؟

۱-آب ولرم ۲-نرمال سالین ۳-آب و صابون ۴-محلول‌های تنقیه یک بار مصرف

۳۶۵- مراقبت از کودک مبتلا به کزاز حالت حمایتی دارد و حین مراقبت پرستار باید به کدام مورد توجه مخصوص کند؟

۱-مشکلات قلبی-مشکلات عصبی ۲-اختلالات بینایی-اختلالات شنوایی ۳-راه‌های هوایی-سیستم تنفس ۴-ریت قلب-برون‌ده ادرار

۳۶۶- مداخله‌ی پرستاری در مورد بیمار مضطرب کدام است؟

۱-پرسیدن سوالات باز از بیمار ۲-تنها نگذاشتن بیمار در هنگام بروز علائم اضطراب

۳-افزایش محرکات محیطی و تشویق بیمار به فعالیت ۴-تنها گذاشتن بیمار در شروع بستری

۳۶۷- کدام مورد از علائم بی‌استهایی عصبی است؟

۱-پرخوابی ۲-اسهال ۳-عدم علاقه به ورزش کردن ۴-ترس از چاق شدن

۳۶۸- کدام یک از مراقبت‌های پرستاری زیر از بیمار با اختلالات شخصیت در اولویت می‌باشد؟

۱-انعطاف‌پذیری در مقابل بیمار ۲-برخورد صادقانه و ثابت با بیمار ۳-متنوع بودن فعالیت‌های روزهای هفته ۴-نادیده گرفتن اشتباهات بیمار

۳۶۹- مناسب‌ترین شیوع برقراری ارتباط حاکی از اعتماد با بیمار دارای اسکیزوفرنی کدام است؟

۱-برقرار کردن رابطه فرد با فرد ۲-درگیر نمودن بیمار در فعالیت‌های گروهی ۳-اصلاح تفکر به هم ریخته شده‌ی بیمار ۴-صحبت کردن با خانواده‌ی بیمار

۳۷۰- عوارض متداول داروی لیتیم که در شروع درمان ظاهر می‌گردد، کدام است/

۱-تهوع و احساس خستگی ۲-گیجی و افزایش وزن ۳-ارزش و احساس تشنگی ۴-عدم هماهنگی در حرکات ماهیچه‌ها

۳۷۱- کدام یک از موارد زیر به عنوان "مانع ارتباطی" پرستاری با مددجو قلمداد می‌گردد/

۱-بیان احساسات مددجو ۲-انعکاس صحبت‌های مددجو به خودش ۳-پیشنهاد دادن به مددجو ۴-باز نگه‌داشتن دامنه‌ی پاسخ به سؤالات برای مددجو

۳۷۲- کدام یک از اقدامات زیر در مراقبت از بیماران مبتلا به PIH خفیف و شدید مشترک است؟

۱-بستری کردن بیمار ۲-محدودیت ملاقاتی ۳-استراحت در تخت ۴-تاریک کردن اتاق

۳۷۳- در پیشگیری از خونریزی در بیمار تحت شیمی درمانی، کدام مورد زیر باید در مراقبت از بیمار تاکید گردد؟

۱-گرفتن درجه حرارت از طریق رکتوم ۲-استفاده از چرب کننده‌های لب ۳-استفاده از دهان‌شویه‌های تجاری ۴-استراحت مطلق در تخت

۳۷۴- در کدام دوره‌ی سنی، کودک قوانین و استانداردها را درک می‌کند؟

۱-پیش دبستانی ۲-دبستانی ۳-نوجوانی ۴-جوانی

۳۷۵- مهم‌ترین هدف پرستاری در هیپوتیروئیدیسم مادرزادی کدام است؟

۱-آموزش والدین ۲-پیشگیری از عفونت ۳-جایگزینی هورمون‌های تیروئید ۴-تشخیص زود هنگام بیمار

- ۳۷۶- مبنای درمان طبیی کودکان مبتلا به تالاسمی کدام است؟
- ۱- ترانسفوزیون ها ۲- کنترل عوارض ۳- فیزیوتراپی ۴- مشاوره روانی
- ۳۷۷- تشخیص قطعی لوسمی با کدام یک از روش های زیر حاصل می شود؟
- ۱- علایم بالینی ۲- نمونه خون محیطی ۳- اسکن استخوان های بدن ۴- آسپیراسیون مغز استخوان
- ۳۷۸- به عنوان پرستار، کدام یک از تمرینات مفصلی و فعالیت ها را برای کودک مبتلا به همفیلی توصیه می کنید؟
- ۱- فعال ۲- غیر فعال ۳- محدودیت حرکتی ۴- حرکات کششی
- ۳۷۹- مهم ترین مداخله ی پرستاری از مددجوی تحت درمان با فنوتیازین ها است؟
- ۱- افزایش مایعات برای دفع بیشتر ۲- پیشگیری از نور مستقیم ۳- جلوگیری از یبوست به وسیله ی ملین ۴- توجه به تغذیه و فعالیت
- ۳۸۰- اقدام پرستار در مورد مددجویی مه دارای "Delirium" می باشد، کدام است؟
- ۱- محافظت نمودن مددجو از آسیب به خود ۲- قرار دادن مددجو در اتاق پرسروصدا ۳- قطع داروهای تجویز شده ۴- دادن داروی خواب آور
- ۳۸۱- اقدام پرستاری ضروری در هنگام تجویز داروهای وقفه دهنده ی منوآمینو اکسیداز کدام است؟
- ۱- کنترل فشار خون ۲- پیشگیری از یبوست ۳- کاهش تعرق ۴- توصیه به مصرف غذاهای حاوی تیرامین
- ۳۸۲- کدام یک از علایم زیر مربوط به اثرات آنتی کولینرژیک داروهای سه حلقه ای ضد افسردگی می باشد؟
- ۱- گشادی مردمک ۲- توهم بینایی ۳- کاهش فشار خون ۴- خواب آلودگی
- ۳۸۳- روش مطالعه برای بررسی نقش سرطان زایی آزبستوز در کارگران معدن کدام است؟
- ۱- هم گروهی گذشته نگر ۲- پژوهش طولی ۳- پژوهش مقطعی ۴- کارآزمایی بالینی
- ۳۸۴- "انگشتان سفید" نشانگر کدام مواجهه شغلی است؟
- ۱- ارتعاش ۲- گرما ۳- پرتو ۴- سرما
- ۳۸۵- اولین تقسیم سلولی اووسیت در کدام مرحله است؟
- ۱- قبل از بلوغ ۲- هنگام تولد ۳- دوران جنینی ۴- قبل از تخم گذاری
- ۳۸۶- کدام مورد از اصول مراقبت های بهداشتی اولیه (PHC) محسوب می شود/
- ۱- مشارکت جامعه ۲- برنامه های پیشگیری ۳- تقویت طب سنتی ۴- بهسازی محیط
- ۳۸۷- غربالگری جزء کلیدی مداخلات کدام سطح از پیشگیری است؟
- ۱- سطح اول ۲- سطح دوم ۳- سطح دوم و سوم ۴- سطح اول و دوم
- ۳۸۸- کدام نوع پژوهش، توصیف کلی از وسعت مشکل سلامت جامعه و برآوردی از میزان شیوع را فراهم کند؟
- ۱- کوهورت ۲- کارآزمایی ۳- مورد- شاهدی ۴- مقطعی
- ۳۸۹- در آموزش سلامت از کدام نظریه برای افزایش عمق دانش استفاده می شود/
- ۱- رفتاری ۲- شناختی ۳- انتقادی ۴- تکاملی
- ۳۹۰- در کشور ما اکثر خانواده های شهری از کدام نوع هستند؟
- ۱- سه نسلی ۲- گسترده ۳- هسته ای ۴- تک والدی
- ۳۹۱- کدام مدل زیر برای پیش بینی احتمال اتخاذ رفتار پیشگیری طراحی شده است؟
- ۱- اعتقاد بهداشتی (بکر) ۲- ارتقای سلامت (پندر) ۳- نظام ها (نیومن) ۴- جامعه به عنوان مددجو (کلارک)
- ۳۹۲- اساسی ترین اقدام برای کاهش عوارض شغلی صدای زیاد محیط کار کدام است؟
- ۱- کاهش ساعت کاری ۲- جداسازی منبع صوتی ۳- آزمایشات دوره ای ۴- اجبار به حفاظت فردی
- ۳۹۳- توصیه ی شما برای کاهش استفراغ صبحگاهی در مادران حامله، کدام است؟
- ۱- حذف صبحانه ۲- نوشیدن قهوه غلیظ ۳- خوردن نان تست و کره ۴- خودداری از خالی بودن معده
- ۳۹۴- کدام مورد در دفع ارار نوزاد، غیر طبیعی است؟

۱- چکیدن ادرار به طور مستمر در نوزاد دختر ۲- کدر بودن اولین ادرار نوزاد ۳- عدم دفع ادرار در ۸ ساعت اول پس از تولد ۴- صورتی بودن اولین ادرار نوزاد
۳۹۵- اولین اولویت در مراقبت از نوزاد کدام است؟

۱- تزریق ویتامین K و پیشگیری از عفونت ۲- تغذیه‌ی نوزاد و توجه به دفع ادرار ۳- برقراری تنفس و کنترل درجه حرارت بدن ۴- کنترل رفلکس‌ها و علائم حیاتی
۳۹۶- برای کاهش درد به روش دکتر دیک رید (Dick Read) تاکید بر کدام است؟

۱- شرطی کردن درد زایمان ۲- کاهش ترس از زایمان ۳- افزایش تحریکات برای سرگرمی مادر ۴- اختلال در مسیر درک درد
۳۹۷- عامل مستعد کننده‌ی نوزاد بزرگ‌تر از سن حاملگی (LGA) کدام است؟

۱- حاملگی دوقلو ۲- مادران دیابتیک ۳- مسمومیت حاملگی ۴- سابقه‌ی سزارین قبلی

۳۹۸- در مراقبت پرستاری از بیمار مبتلا به پنومونی عفونی، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

۱- هیدراسیون سریع بیمار بیش از ۳ لیتر در روز ۲- استفاده از ماسک اکسیژن با رطوبت و فشار کم

۳- کنترل علائم گیجی ناشی از هیپوکسمی ۴- استفاده از ساکشن نازوتراکیال هر ۶ ساعت

۳۳۹- در بررسی بیماری نواحی تنه (قدام و خلف) و هر دو دست کاملاً دچار سوختگی را چگونه محاسبه می کنید (بر اساس قانون ۹) ؟

۱- ۳۷٪ ۲- ۳۶٪ ۳- ۵۴٪ ۴- ۷۲٪

۴۰۰- شیرخوار به کدام یک از رفتارهای تکاملی زیر زودتر دست می یابد؟

۱- توجه به صداها و ایجاد شده در سطح گوش ۲- برگرداندن سر در جهت صدا ۳- تکامل درک عمق بینایی ۴- شروع هماهنگی بین دست و چشم

پاسخنامه

4	189	2	142	1	95	3	48	3	1
1	190	4	143	1	96	2	49	1	2
2	191	1	144	4	97	3	50	1	3
2	192	3	145	2	98	2	51	2	4
4	193	2	146	3	99	4	52	2	5
3	194	1	147	4	100	2	53	4	6
4	195	2	148	2	101	2	54	1	7
3	196	4	149	4	102	2	55	4	8
2	197	2	150	3	103	1	56	2	9
1	198	3	151	4	104	2	57	2	10
4	199	2	152	2	105	2	58	3	11
2	200	4	153	1	106	3	59	3	12
1	201	1	154	2	107	2	60	2	13
3	202	4	155	4	108	2	61	2	14
2	203	2	156	2	109	3	62	4	15
4	204	1	157	2	110	2	63	1	16
2	205	4	158	1	111	1	64	2	17
3	206	4	159	3	112	3	65	4	18
4	207	2	160	2	113	3	66	1	19
4	208	2	161	3	114	1	67	2	20
1	209	3	162	4	115	3	68	4	21
4	210	2	163	1	116	3	69	1	22
3	211	3	164	3	117	2	70	4	23
4	212	3	165	4	118	2	71	2	24
2	213	1	166	3	119	3	72	1	25
4	214	4	167	2	120	3	73	4	26
2	215	2	168	4	121	4	74	4	27
1	216	2	169	2	122	4	75	2	28
4	217	1	170	3	123	4	76	3	29
3	218	4	171	2	124	1	77	1	30
4	219	2	172	1	125	2	78	4	31
3	220	3	173	4	126	1	79	2	32
2	221	4	174	3	127	2	80	3	33
1	222	4	175	1	128	4	81	2	34
4	223	2	176	2	129	1	82	4	35
1	224	2	177	3	130	2	83	2	36
2	225	2	178	2	131	3	84	1	37
2	226	1	179	3	132	1	85	4	38
4	227	2	180	1	133	4	86	1	39
3	228	1	181	3	134	2	87	3	40
3	229	4	182	4	135	1	88	2	41
3	230	4	183	1	136	4	89	3	42
2	231	3	184	2	137	3	90	2	43
2	232	1	185	2	138	3	91	4	44
1	233	4	186	1	139	2	92	4	45
1	234	2	187	4	140	4	93	1	46
3	235	4	188	4	141	1	94	3	47

4	377	1	330	3	283	1	236
1	378	3	331	2	284	4	237
2	379	2	332	1	285	3	238
1	380	1	333	3	286	4	239
1	381	1	334	1	287	2	240
1	382	4	335	1	288	1	241
1	383	4	336	2	289	2	242
1	384	3	337	1	290	2	243
3	385	4	338	1	291	3	244
1	386	2	339	1	292	4	245
2	387	1	340	2	293	2	246
4	388	4	341	1	294	1	247
3	389	2	342	4	295	1	248
3	390	1	343	2	296	2	249
1	391	3	344	2	297	4	250
2	392	4	345	4	298	4	251
4	393	4	346	1	299	2	252
1	394	3	347	4	300	4	253
3	395	3	348	3	301	2	254
2	396	1	349	1	302	1	255
2	397	3	350	2	303	3	256
3	398	4	351	3	304	2	257
3	399	1	352	4	305	2	258
1	400	3	353	3	306	1	259
		3	354	3	307	2	260
		2	355	1	308	4	261
		3	356	3	309	2	262
		3	357	4	310	4	263
		4	358	3	311	2	264
		2	359	1	312	2	265
		1	360	1	313	2	266
		2	361	2	314	4	267
		2	362	3	315	1	268
		3	363	2	316	4	269
		2	364	4	317	2	270
		3	365	2	318	2	271
		2	366	1	319	4	272
		1	367	4	320	3	273
		2	368	4	321	1	274
		2	369	4	322	3	275
		1	370	2	323	1	276
		3	371	1	324	4	277
		3	372	1	325	1	278
		2	373	3	326	4	279
		1	374	3	327	1	280
		4	375	4	328	2	281
		2	376	3	329	1	282